







5705

Palat. LX 1 (111)

BIBLIOTHÈQUE

UNIVERSELLE

DES DAMES.

Septième Classe.

MATHÉMATIQUES.



Il paroît tous les mois deux volumes de cette Bibliothèque. On les délivre soit brochés, soit reliés en veau fauve ou écaillé, & dorés sur tranche, ainsi qu'avec ou sans le nom de chaque Souscripteur imprimé au frontispice de chaque volume.

La souscription pour les 24 vol. reliés est de 72 liv., & de 54 liv. pour les volumes brochés.

Les Souscripteurs de Province, auxquels on ne peut les envoyer par la poste que brochés, payeront de plus 7 liv. 4 s. à cause des frais de poste.

Il faut s'adresser à M. CUCHET, Libraire, rue & hôtel Serpente, à Paris.

BIBLIOTHÈQUE

UNIVERSELLE

DES DAMES.

ALGÈBRE.

TOME SECOND.



A PARIS,

RUE ET HÔTEL SERPENTE.

*Avec Approbation & Privilège
du Roi.*

1789.



BIBLIOTHÈQUE

UNIVERSELLE

DÈS DAMES.

ALGÈBRE.

SECONDE PARTIE.

DE L'ANALYSE,

OU

APPLICATION DE L'ALGÈBRE
À LA RÉOLUTION DE QUELQUES
PROBLÈMES.

APRÈS avoir traversé les déserts arides de l'*Algebre* proprement dite, c'est-à-dire, des calculs algébriques sans objet déterminé, nous allons parcourir une route plus amusante, celle de l'*Analyse*, ou de l'application de
Algebre. Tome II. A

l'Algebre à la résolution de quelques problèmes simples & faciles. Les Lecteurs vont être récompensés de leurs travaux & de leur constance, par le plaisir de découvrir des choses qui paroissent au premier coup-d'œil presque impossibles à trouver.

L'*Analyse* est proprement la méthode de résoudre les problèmes mathématiques, en les réduisant à des équations.

L'*Analyse*, pour résoudre tous les problèmes, emploie le secours de l'Algebre, ou le calcul des grandeurs en général : aussi ces deux mots *Analyse*, *Algebre*, sont souvent regardés comme synonymes.

L'*Analyse* est l'instrument ou le moyen général par lequel on a fait depuis près de deux siècles, dans les Mathématiques, de si belles découvertes. Elle fournit les exemples les plus parfaits de la manière dont on doit employer l'art du

raisonnement, donne à l'esprit une merveilleuse promptitude pour découvrir des choses inconnues au moyen d'un petit nombre de données, & en employant des signes abrégés & faciles pour exprimer les idées, elle présente à l'entendement des choses, qui autrement sembleroient être hors de sa sphère. Par ce moyen, les démonstrations géométriques peuvent être singulièrement abrégées; une longue suite d'argumens où l'esprit ne pourroit, sans le dernier effort d'attention, découvrir la liaison des idées, est convertie en des signes sensibles, & les diverses opérations qui y sont requises, sont effectuées par la combinaison de ces signes. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que, par le moyen de cet art, un grand nombre de vérités sont souvent exprimées par une seule ligne; au lieu que, si on suivoit la manière ordinaire d'expliquer & de démontrer, ces vérités ren-

pliroient des volumes entiers. Ainsi par la seule étude d'une ligne de calcul , on peut apprendre en peu de tems des sciences entières , qui autrement pourroient à peine être apprises en plusieurs années.

L'*Analyse* est divisée , par rapport à son objet , en *analyse des quantités finies* , & *analyse des quantités infinies*.

Analyse des quantités finies est ce que nous appelons autrement *Arithmétique spéciouse* ou *Algebre*.

Analyse des quantités infinies ou des infinis , appelée aussi *la nouvelle Analyse* , est celle qui calcule les rapports des quantités qu'on prend pour infinies , infiriment petites. Une de ses principales branches est la *méthode des fluxions* , ou le *Calcul différentiel*. Nous n'en traiterons pas dans des Elémens aussi courts que ceux-ci.

Le grand avantage des Mathémati-

ciens modernes sur les anciens, vient principalement de l'usage qu'ils font de l'Analyse.

EQUATION en Algèbre signifie une expression de la même quantité présentée sous deux dénominations différentes.

Aussi quand on dit $2 \times 3 = 4 + 2$, cela veut dire qu'il y a *équation* entre deux fois trois & quatre plus deux.

On peut définir *l'équation*, un rapport d'égalité entre deux quantités de différentes dénominations, comme quand on dit 60 sous $= 3^{\text{th}}$, ou 20 sous $= 1$ livre, ou $b = d + e$ ou $12 = \frac{a + b}{5}$, &c.

Ainsi, mettre des quantités en *équation*, c'est représenter, par une double expression, des quantités réellement égales & identiques.

Le caractère ou le signe de *l'équation* est $=$ ou ∞ ; ce dernier est plus fré-

quent dans les anciens Algébristes, & l'autre dans les modernes.

La résolution des problèmes, par le moyen de leurs *équations*, est l'objet de l'Algebre.

Membres d'une équation. Ce sont les deux quantités qui sont séparées par les signes $=$ ou ∞ ; & *termes d'une équation*, ce sont les différentes quantités ou parties dont chaque membre de l'équation est composé, & qui sont jointes entr'elles par les signes $+$ & $-$. Ainsi dans l'équation $b+c=d$, $b+c$ est un *membre*, & d l'autre; b , c , d , sont les *termes*; & l'équation signifie que la seule quantité d est égale aux deux b & c prises ensemble.

Racine d'une équation, est la valeur de la quantité inconnue de l'équation. Ainsi dans l'équation $a^2+b^2=x^2$, la racine est $\sqrt{a^2+b^2}$.

Les *équations*, eu égard à la puis-

sance plus ou moins grande, à laquelle l'inconnue y monte, se divisent en *équations* simples, quarrées, cubiques, &c.

Equation simple ou *du premier degré*, est celle dans laquelle l'inconnue ne monte qu'à la première puissance ou au premier degré, comme $x = a + b$.

Equation quarrée ou *du second degré*, est celle où la plus haute puissance de l'inconnue est de deux dimensions, comme $x^2 = a^2 + b^2$, ou $x^2 + ax = b^2$, ou celle dans laquelle l'inconnue est multipliée par une autre inconnue, toutes deux à la première puissance, comme..... $xy = b$.

Equation cubique ou *du troisième degré*, est celle où la plus haute puissance de l'inconnue est de trois dimensions, comme $x^3 = a^3 - b^3$ ou $x^3 + axx + bbx = c^3$; ou celle dans laquelle l'inconnue est multipliée par une ou par deux autres inconnues, de manière que la somme des exposans de ce

produit soit $= 3$. *Exemple*, $xyz = b$,
ou $x^2y = c$, ou $xz^2 = c$.

Si la quantité inconnue est de quatre dimensions, comme $x^4 = a^4 - b^4$ ou $x^4 + ax^3 + b^3x = c^4$, l'équation est appelée *biquadratique* ou *quarrée quarrée*, ou plus communément du *quatrième degré*; si l'inconnue a cinq dimensions, l'équation est nommée *surde-solide*, ou du *cinquième degré*, &c. Ces deux cas ne changent pas de dénominations, lorsque l'inconnue y est multipliée comme ci-dessus, par une, par deux, par trois, ou par quatre autres inconnues, de manière que la somme des exposans de ce produit soit $= 4$, ou $= 5$.

On peut considérer les *équations* sous deux points de vue, ou comme les dernières conclusions auxquelles on arrive dans la solution des problèmes, ou comme les moyens par lesquels on parvient à la solution finale.

Les *équations* de la première espèce

ne renferment qu'une quantité inconnue mêlée avec d'autres quantités données ou connues ; celles de la seconde espèce renferment différentes quantités qui doivent être comparées & combinées ensemble , jusqu'à ce que l'on arrive à une nouvelle équation qui ne renferme plus qu'une inconnue mêlée avec des connues.

Pour trouver la valeur de cette inconnue , on prépare & on transforme l'équation de différentes manières , qui servent à l'abaisser au moindre degré , & à la rendre la plus simple qu'il est possible.

La théorie & la pratique des *équations* , c'est-à-dire , la solution des questions par les *équations* , a plusieurs branches ou parties. 1°. La dénomination qu'on doit donner aux différentes quantités en les exprimant par les signes ou symboles convenables. 2°. La réduction du problème en équation. 3°. La

A v.

réduction de l'*équation* même au degré le plus bas, & à la forme la plus simple. 4°. On y peut ajouter la solution de l'*équation*, ou la représentation de ses racines par des nombres ou des lignes. Nous allons d'abord donner les règles particulières aux deux premiers articles, c'est-à-dire, en général la méthode de mettre en *équation* une question proposée.

Une question ou un problème étant proposé, on suppose que les choses cherchées, ou demandées sont déjà trouvées, & on les marque ordinairement par les dernières lettres de l'alphabet comme *u, x, y, z, &c.* marquant en même-tems les quantités connues par les premières lettres de l'alphabet, comme *a, b, c, d, e, f, &c.* Lorsque celles de notre alphabet ne suffisent pas, on emploie encore l'alphabet grec.

Toutes les quantités qui doivent entrer dans la question, étant ainsi nom-

mées, on examine si la question est sujette à restriction, ou non, c'est-à-dire, si elle est déterminée ou indéterminée. Voici les règles par lesquelles on peut le savoir.

1°. S'il y a plus de quantités inconnues qu'il n'y a d'équations données ou renfermées dans la question, le problème est indéterminé, & peut avoir une infinité de solutions. Quand les *équations* ne sont pas expressément contenues dans le problème, on les trouve par le moyen des théorèmes sur l'égalité des grandeurs.

2°. Si les équations données ou renfermées dans le problème, sont précisément en même nombre que les quantités inconnues, le problème est déterminé, c'est-à-dire, n'admet qu'un nombre de solutions limité.

3°. S'il y a moins d'inconnues que d'*équations*, le problème est plus que déterminé, & on découvre quelquefois

qu'il est impossible par les contradictions qui se trouvent dans les équations.

Maintenant pour mettre une question en équation, c'est-à-dire, pour la réduire en différentes équations médiates, par le moyen desquelles on puisse parvenir à une équation finale, la principale chose à laquelle on doit faire attention, c'est d'exprimer toutes les conditions de la question par autant d'équations. Pour y parvenir, il faut examiner si les propositions, ou mots dans lesquels la question est exprimée, peuvent être rendus par des termes algébriques, comme nous rendons nos idées ordinaires en caractères grecs, latins ou français, &c. Si cela est ainsi, comme il arrive généralement dans toutes les questions que l'on fait sur les nombres ou sur les quantités abstraites, en ce cas, il faut donner des noms aux quantités inconnues & connues, autant que la question le demande, & traduire ainsi, en lan-

gage algébrique, le sens de la question. Ces conditions, ainsi traduites, donneront autant d'équations que le problème peut en fournir. Nous allons donner dans les deux articles suivans un grand nombre d'exemples de cette traduction d'une question en langue algébrique.

Résolution des équations du premier degré, avec une seule inconnue.

N. B. On appelle quelquefois *équations linéaires*, les équations du premier degré, parce que les inconnues qu'elles renferment, n'offrent qu'une seule dimension, comme les lignes de la Géométrie.

Une équation est résolue quand on est parvenu à laisser toute seule dans un membre l'inconnue dont on cherche la valeur, & à n'avoir dans l'autre membre que des quantités connues. Alors en effet, le problème est résolu, puisqu'une

quantité égale à des quantités connues celle d'être inconnue.

PROBLÈME I. *Un pere a six fois autant d'âge que son fils, & la somme des deux âges est de 91 ans. Quel est l'âge du fils? quel est celui du pere?*

Pendant que les Arithméticiens tâtonneront, l'Algébriste dira..... J'appelle x l'âge du fils; donc par l'énoncé du problème, l'âge du pere sera $6 \times x$, ou $6x$. Or ces deux âges réunis doivent faire 91 ans; donc $6x + x$, ou $7x = 91$; & voilà le problème mis en équation.

A présent qu'il est, pour ainsi dire, traduit en langage algébrique, le reste de la solution n'est qu'un jeu..... Si

$$7x = 91, \text{ dira-t-on, donc } \frac{7x}{7} = \frac{91}{7},$$

ou $x = \frac{91}{7}$, ou $x = 13$; & par conséquent le fils a 13 ans. Le pere en a donc 78; & la preuve en est que $13 +$

$78 = 91$; ce qui satisfait à la condition du problème.

Concluons de cet exemple , que *POUR DÉGAGER L'INCONNUE , quand elle est affectée d'un coefficient quelconque , il faut diviser toute l'équation par ce même coefficient.* Ainsi pour connoître la valeur de x dans l'équation suivante

$$ax = b, \text{ on écrira } x = \frac{b}{a}.$$

PROBLÈME II. *Quel est le nombre dont le tiers & le quart ajoutés ensemble font 63 ?*

Ce nombre m'est inconnu ; mais quel qu'il soit , je l'appelle x . Son tiers est donc $\frac{1}{3}x$, ou $\frac{1x}{3}$, ou $\frac{x}{3}$, & son quart $\frac{x}{4}$. Ces deux parties réunies doivent faire 63. J'ai donc pour équation du problème... $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 63.$

Réduisant au même dénominateur, & ajoutant les deux fractions, j'aurai...

$$\frac{7x}{12} = 63. \text{ Le coefficient de l'incon-}$$

nue sera donc $\frac{7}{12}$, par lesquels je diviserai les deux membres de l'équation, suivant la regle précédente : ce qui me

$$\text{donnera } \frac{7x}{12} : \frac{7}{12} = \frac{63}{1} : \frac{7}{12},$$

$$\text{ou } \dots x = \frac{12.63}{7.1} = \frac{12.63}{7} =$$

$$\frac{756}{7} = 108. \text{ Effectivement le tiers}$$

de 108 est 36, le quart de 108 est 27 ; & $36 + 27 = 63$.

Concluons de cet exemple que toutes les équations de cette forme.....

$$\frac{ax}{b} = c, \text{ se résolvent en écrivant}$$

$$x = \frac{bc}{a} : \text{c'est-à-dire, que pour dé-}$$

GAGER UNE INCONNUE affectée d'un coefficient fractionnaire, il faut multiplier tous les termes de l'équation par le dénominateur de ce coefficient, & les diviser par son numérateur.

PROBLÈME III. *On demande un nombre tel qu'en le divisant par 5, on ait un quotient, qui ajouté au produit de ce même nombre par 4, & au multiplicateur 4, fasse 12,5 ?*

Si on appelle x le nombre demandé,

on aura..... $\frac{x}{5} + 4x + 4 = 12,5.$

Multipliant tout par le dénominateur 5 pour faire disparaître la fraction $\frac{x}{5}$,

on aura.... $\frac{5x}{5} + 20x + 20 = 62,5;$

ou $x + 20x + 20 = 62,5$; d'où l'on tirera $21x + 20 = 62,5.$

Or toutes les fois que deux quantités sont égales, on peut ajouter ou souf-

traire de part & d'autre une même quantité ; on peut tout multiplier ou tout diviser par le même nombre ; on peut tout élever à une même puissance , sans détruire l'égalité des deux membres de l'équation.

J'en puis donc soustraire 20 , par exemple , de chacun de ces membres dans l'équation..... $21x + 20 = 62,5$, & dire... $21x + 20 - 20 = 62,5 - 20$, on en déduit..... $21x = 42,5$. Mais par la première règle on dégage l'inconnue de son coefficient.....

$$x = \frac{42,5}{21} ; \text{ donc } x = 2 + \frac{1}{42} =$$

$$\frac{85}{42} ; \text{ ce qui eut été un peu long à}$$

trouver par les tâtonnemens de l'Arithmétique. Voici la preuve de la solution du problème.....

$$\left(\frac{85}{42} : 5 \right) + \left(\frac{85}{42} \times 4 \right) + 4 = 12,5.$$

Il suit de la remarque précédente que pour faire passer une quantité positive d'un membre dans un autre, on n'a qu'à effacer cette quantité dans le membre où elle est, & l'écrire dans l'autre membre avec le signe $-$. Ainsi toute équation de cette forme.... $x + a = b$, se réduit à celle-ci..... $x = b - a$.

Et réciproquement pour transporter d'un membre à l'autre une quantité négative, on l'effacera dans le membre où elle est, & on l'écrira dans l'autre membre avec le signe $+$.

EXEMPLE..... $x - m = p$; donc $x = p + m$. En général, si on a.... $x \pm c = h$, on en conclura que $h \mp c = x$. Cette règle est d'un grand usage.

Avec ce petit nombre de principes & d'opérations bien élémentaires, il n'y a point d'équation du premier degré qui ne se résolve très-promptement. Prenons pour exemple un des cas les plus compliqués; & proposons-nous de trou-

ver la valeur de l'inconnue x dans l'équation suivante.....

$$\frac{ax}{b} + \frac{cx}{f} + m = px + \frac{cx}{f} + n.$$

D'abord je vois que les deux membres contiennent une même quantité $\frac{cx}{f}$, affectée du même signe. L'égalité subsistera donc, après que l'on aura retranché de part & d'autre cette quantité (quand on trouve ainsi précédés du même signe des termes communs aux deux membres, il ne faut pas manquer de les effacer). On n'aura donc plus à résoudre que l'équation,

$$\frac{ax}{b} + m = px + n.$$

Je vois ensuite que pour laisser x toute seule dans un membre, il faut que je transporte du même côté les quantités connues, & que l'autre membre

soit formé seulement des termes qui contiennent x . La règle des transpositions observée me donne

$$\frac{ax}{b} - px = n - m.$$

REMARQUE. Quelquefois on est embarrassé pour savoir dans quel sens on fera ces sortes de transpositions : ici, par exemple, il n'y a pas plus de raison pour transposer le terme px dans le premier membre, que le terme

$\frac{ax}{b}$ dans le second. Cela dépend

uniquement de celui qui résoud le problème. La valeur de l'inconnue est la même dans les deux cas. Seulement elle est positive dans l'un, & négative dans l'autre.

A présent que l'équation est transposée, il ne reste plus qu'à dégager l'inconnue ; & pour cela je multiplie tout par le dénominateur b , ce qui me donne,

$$ax - bpx = bn - bm,$$

$$\text{ou } (a - bp)x = (n - m)b.$$

A cette nouvelle préparation, j'en fais succéder une autre, qui est celle de la division de toute l'équation par le coefficient de l'inconnue. Ce coefficient est $a - bp$; j'ai donc enfin,

$$x = \frac{(n - m)b}{a - bp}.$$

PROBLÈME IV. *A la suite d'une inondation, il est tombé dans un même jour la moitié des maisons d'une ville; il en est tombé le tiers le lendemain, & le douzième dans les jours suivans; on n'en compte plus que 63 sur pied. De combien de maisons cette ville étoit-elle composée avant l'inondation?*

Soit x le nombre cherché; $\frac{x}{2}$ fera l'expression du nombre des bâtimens écroulés le premier jour: $\frac{x}{3}$ & $\frac{x}{12}$

exprimeront combien il en est tombé dans les jours suivans ; l'équation du problème sera donc :

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{12} + 63 = x.$$

Supposons, pour abréger, que $63 = a$, & que l'on multiplie toute l'équation par le plus grand dénominateur qui est ici 12. On aura d'abord.....

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{12} + a = x \dots\dots$$

$$\text{puis } \frac{12x}{2} + \frac{12x}{3} + x + 12a =$$

$$12x \dots\dots\dots$$

$$6x + 4x + x + 12a = 12x.$$

$$\text{Réduisant } \dots\dots 11x + 12a = 12x.$$

Retranchant de part & d'autre la quantité commune $11x$, il restera pour solution du problème.....

$$12a = 12x - 11x \dots\dots 12a = x \dots\dots$$

$$12.63 = x \dots\dots 756 = x.$$

Cette ville renfermoit donc dans son enceinte 756 maisons.

PROBLÈME V. *Trois amis, que nous désignerons l'un par B, l'autre par C, & le troisième par D, ont pris en commun des billets de Loterie. La mise de B jointe à celle de C, est de 21^{te}. Ce que B & D ont mis d'argent fait 24^{te}. Les deux mises de C & D font 27^{te}. Quelle est la mise de chacun ?*

On exprime d'abord les quantités connues par les premières lettres de l'alphabet..... $a=21$ $e=24$ $f=27$; ensuite par x la mise de B. La mise de C est $a-x$; & celle de D est $e-x$. Or l'énoncé du problème porte que ces deux dernières mises font 27^{te}. Donc.... $a-x+e-x=f$, ou $a+e-2x=f$.. ou $a+e-f=2x$..

ou $x = \frac{a+e-f}{2}$ ce qui

donne..... $x=9^{\text{te}}$, mise de B.....

$a-x=12^{\text{te}}$,

$a - x = 12^{\text{te}}$, mise de C.....

$c - x = 15^{\text{te}}$, mise de D.

REMARQUE. Au premier aperçu de ce problème, il paroïssoit indispensable de regarder les trois mises comme trois inconnues différentes : mais en y regardant de plus près, on a dû voir qu'une seule de ces mises étant déterminée, elle rendoit les deux autres déterminées comme elle. D'où on conclut *que le nombre des inconnues ne dépend pas du nombre des questions particulières que l'énoncé d'un problème renferme, mais du degré de liaison qui existe entre les conditions du problème proposé.*

Ce n'est pas, au reste, que l'on ne fût parvenu à la solution du problème, en introduisant trois inconnues dans le calcul. On en verra la preuve dans les problèmes suivans. Mais en général il faut toujours tendre aux solutions les plus simples ; & c'est le tact particulier

de chaque Algébriste qui lui fera découvrir la voie qui mène à ces solutions. Les livres & les Maîtres peuvent donner seulement la sagacité nécessaire pour démêler dans un problème ce qui en est le principe & ce qui en est l'accessoire. Les exemples multipliés forment le tact du calculateur ; c'est pourquoi nous en donnerons encore plusieurs.

PROBLÈME VI. *Par le testament d'un pere , son fils aîné doit prélever d'abord 1000 écus sur la masse des biens , puis prendre le sixième de ce qui restera. La part du second doit être formée de 2000 écus , & du sixième de ce qui restera. La part du troisième doit être composée de 3000 écus & du sixième de ce qui restera. . . . Ainsi de suite jusqu'au dernier dont la part sera le reste de celle de ses frères. On exécute les dispositions du testament , & le partage des enfans se trouve égal. On demande d'après cela , 1°. Quel est le*

bien du pere ? 2°. Combien il y a d'enfans ? 3°. Quelle est la part de chacun ?

Ce problème paroît au premier coup-d'œil renfermer trois inconnues. Cependant on voit 1°. que si le bien du pere étoit connu, tout le reste le seroit... 2°. Que la part du fils aîné est 1000 écus, plus le sixième du bien du pere diminué de ces 1000 écus... 3°. Que toutes les parts étant égales, en divisant le bien du pere par la part de l'aîné, on aura pour quotient le nombre des parts.. Cela posé, il faut s'occuper uniquement de la recherche du bien du pere, que l'on appelle x ; a sera = 1000.

L'aîné ayant pris 1000 écus, ou a sur ce bien, le reste du bien sera $x - a$; ainsi la part totale de cet aîné sera $a + \frac{x - a}{6}$, ou par la réduction en une

seule fraction $\frac{6a + x - a}{6}$, ou,

$\frac{5a+x}{6}$. Les parts étant égales on

mettra en équation avec celle de l'aîné la part du second.

Pour trouver la part du second, il faut d'abord retrancher du bien du pere la part de l'aîné; par cette soustraction le bien du pere devient.....

$$x - \left(\frac{5a+x}{6} \right) = x - \frac{5a-x}{6} =$$

$$\frac{6x - 5a - x}{6} = \frac{5x - 5a}{6}. \text{ Cher-}$$

chons sur ce reste la part du second; c'est, 1°. 2000 écus ou $2a$; 2°. le fixiè-

me du reste. Ce reste est $\frac{5x - 5a}{6}$

$$2a = \frac{5x - 5a - 12a}{6} = \frac{5x - 17a}{6}.$$

La part totale du second composée de $2a$ & du fixième du reste, est donc

$$2a + \frac{1}{6} \left(\frac{5x - 17a}{6} \right) = 2a + \dots$$

$$\frac{5x - 17a}{36} = \frac{72a + 5x - 17a}{36} =$$

$$\frac{55a + 5x}{36}.$$

L'équation du problème renfermant les parts égales de l'aîné & du second fils, sera donc..... $\frac{5a + x}{6} =$

$$\frac{55a + 5x}{36}.$$

Cette équation étant du premier degré, & ne renfermant qu'une inconnue, donne par des dégagemens successifs la valeur de cette inconnue. Pour délivrer de fraction le premier membre, on multipliera le numérateur du second par 6 dénominateur du pre-

$$\text{mier..... } 5a + x = \frac{330a + 30x}{36}.$$

On délivrera par une opération sem-

blable le second membre.....

$180a + 36x = 330a + 30x$. Transposant tous les termes, renfermant x dans le premier membre.....

$36x - 30x = 330a - 180a$

$6x = 150a$ Délivrant x de son

coefficient..... $x = \frac{150}{6}a$

$x = 25a$ substituant la valeur de a le bien du pere, ou $x = 25000$ écus.

Le bien du pere, étant de 25000 écus, la part de chaque fils est de 5000 écus, & les fils étoient cinq.

PROBLÈME VII. *A & B se sont mis au jeu, ayant autant d'argent l'un que l'autre. Ils en ont perdu une partie; A a perdu 12^{tt}; B a perdu 57^{tt}, de sorte qu'après ces deux pertes, B n'a plus que le quart de l'argent qui reste à A; combien avoient-ils avant le jeu?*

Ils avoient chacun x de livres; ainsi

après le jeu, A n'a plus que $x - 12$;
B de même n'a plus que $x - 57$. Mais
par l'énoncé du problème.....

$$x - 57 = \frac{1}{4} (x - 12) \dots \dots \dots \text{Donc}$$

$$x - 57 = \frac{x}{4} - \frac{12}{4} \dots \dots \dots$$

$$x - 57 = \frac{x}{4} - 3 \dots \dots \dots$$

$$x - \frac{x}{4} = 57 - 3 \dots \frac{3}{4} x = 54 \dots$$

$$3x = 216 \dots x = 72^{\text{te}}.$$

PROBLÈME VIII. *Quel est le nombre
dont le tiers & le cinquième diffèrent
entr'eux de 8 ?*

Soit x ce nombre.....on a....
 $\frac{1}{3}x - \frac{1}{5}x = 8$. Réduisant les deux frac-
tions au même dénominateur, & effec-
tuant la soustraction.... $\frac{2}{15}x = 8 \dots \dots$
 $2x = 120 \dots x = 60$. En effet, le tiers
de 60 est 20, le cinquième de 60 est
12, & $20 - 12 = 8$.

La manière la plus élégante de ré-

foudre ce problème, & la plus utile à cause de sa généralité, auroit été d'exprimer en lettres toutes les connues de

$$\text{cette sorte.} \quad 8 = a \dots \frac{1}{3} = \frac{1}{m} \dots$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{n} \dots \text{ce qui auroit donné} \dots$$

$$\frac{x}{m} - \frac{x}{n} = a \dots x = \frac{a m n}{n - m} \dots$$

& en substituant les valeurs.

$$x = \frac{8 \cdot 3 \cdot 5}{5 - 3} \dots x = 60.$$

PROBLÈME IX. *Après avoir divisé un nombre par 6, le quotient s'est trouvé tel qu'en l'ajoutant avec le diviseur & le dividende, on a eu pour somme totale 69. Quel est ce nombre?*

Soit le nombre cherché $= x \dots$
 $6 = a \dots 69 = b \dots$ on a pour l'équa-

$$\text{tion du problème } \frac{x}{a} + a + x = b \dots$$

$$x + \frac{x}{a} = b - a \dots\dots\dots$$

$$ax + x = (b - a)a \dots\dots\dots$$

$$x(a + 1) = (b - a)a \dots\dots\dots$$

$$x = \frac{(b - a)a}{a + 1} \dots\dots \text{substituant les}$$

$$\text{valeurs} \dots\dots x = \frac{(69 - 6)6}{7} \dots\dots\dots$$

$$x = 54.$$

Résolution des équations du premier degré, avec plusieurs inconnues.

PROBLÈME X. *La somme & la différence de deux quantités, trouver chacune de ces quantités?*

Soient y la plus petite des quantités, x la plus grande..... a la somme.... b la différence. L'énoncé du problème donne les deux équations suivantes :

$$x + y = a \dots\dots x - y = b.$$

Si l'on prend la valeur de x

1°. dans la première équation , on aura $x = a - y$. 2°. Dans la seconde , on aura $\dots x = b + y$, ces deux valeurs de x étant égales , on en forme une nouvelle équation. $\dots a - y = b + y \dots$ qui ne renfermant qu'une seule inconnue , donne sa valeur $\dots a - b = 2y \dots$

$$y = \frac{a - b}{2} = \frac{1}{2}(a - b) = \frac{1}{2}a - \frac{1}{2}b.$$

La valeur de y étant connue , on trouvera celle de x , par le moyen de l'équation $x = a - y$, en y substituant la valeur de y , c'est-à-dire, $\frac{1}{2}(a - b)$. L'équation devient $x = a - \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$, ou $x = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b$.

C'est ici où l'on reconnoîtra le grand avantage de l'Algebre , d'offrir une vérité générale sous la forme d'une expression particulière. Les valeurs de x & de y nous apprennent que *connoissant la somme & la différence de deux quantités , on trouvera toujours*, 1°. la

plus grande, en ajoutant la moitié de la somme à la moitié de la différence; 2°. la plus petite, en retranchant la moitié de la différence de la moitié de la somme. La Géométrie nous offrira plusieurs occasions d'appliquer cette observation; nous allons sur le champ l'appliquer à des problèmes numériques.

Applications. 1°. Deux frères ont 57 ans à eux deux; l'aîné a 7 ans de plus que le cadet. Quel est l'âge de chacun?

La moitié de la somme est $28\frac{1}{2}$; la moitié de la différence est $3\frac{1}{2}$. L'aîné a donc $28\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2}$, ou 32 ans; & le cadet $28\frac{1}{2} - 3\frac{1}{2}$, ou 25 ans.

2°. Une maison composée de deux étages a 35 pieds de haut. Le premier étage est de 4 pieds plus élevé que le second. Quelle est la hauteur des deux étages?

La demi-somme $= 17\frac{1}{2}$, la demi-différence $= 2$; ainsi le premier étage

$= 17\frac{1}{2} + 2$, ou $= 19\frac{1}{2}$ pieds; & le second $17\frac{1}{2} - 2$, ou $= 15\frac{1}{2}$ pieds.

REMARQUE. Au lieu de résoudre ce *Problème X* en comparant les deux valeurs de x , on eût pu, 1°. ajouter les deux équations du problème, & n'en faire qu'une seule, de cette sorte :

$$\left. \begin{array}{l} x+y=a \\ x-y=b \end{array} \right\} \begin{array}{l} x+y+x-y=a+b, \\ 2x=a+b. \end{array}$$

Ce qui fait trouver tout de suite la valeur de x ... $x = \frac{1}{2}(a+b)$. On eût pu, 2°. soustraire la seconde équation de la première,

$$\left. \begin{array}{l} x+y=a \\ x-y=b \end{array} \right\} \begin{array}{l} x+y-x+y=a-b, \\ 2y=a-b. \end{array}$$

La valeur de y auroit été trouvée par la même promptitude... $y = \frac{1}{2}(a-b)$.. Mais ces méthodes abrégées ne trouvent pas toujours leur application avec autant de facilité; c'est à la sagacité du calculateur à faire le choix de celle qui convient le mieux à son problème.

Nous

Nous allons employer la soustraction pour résoudre de nouveau le *problème I*, en y introduisant deux inconnues....

Un pere, y disoit-on, *a six fois aiant d'âge que son fils*, & la somme des deux âges fait 91 ans. Soient x l'âge du pere..... y l'âge du fils, on aura les deux équations du problème,

$$x = 6y \dots x + y = 91.$$

Par la soustraction de la première équation, on aura. $x + y - x = 91 - 6y$.
 $y = 91 - 6y$. $6y + y = 91$. $7y = 91$
 $y = \frac{91}{7}$. $y = 13$. donc $x = 78$, comme nous l'avions trouvé par la première méthode, qui est toujours préférable lorsqu'on peut l'employer.

Elimination des inconnues.

La première opération de celui qui résout un problème à plusieurs inconnues, doit être la réduction successive de toutes ces inconnues à une seule dont

il cherchera ensuite la valeur par les moyens exposés ci-devant. On se sert dans ce cas du mot *éliminer*, pour exprimer l'exclusion que l'on donne à chaque inconnue, sauf la dernière.

Cette *élimination* se fait en prenant d'abord la valeur d'une même inconnue dans deux équations différentes, & en égalant ces deux valeurs, pour avoir en y , par exemple, la valeur de x . C'est ainsi qu'après avoir trouvé dans le dernier problème..... $x + y = a$ $x - y = b$ on a conclu..... $x = a - y$ $x = b + y$ & puis..... $a - y = b + y$.

On peut aussi, après avoir pris la valeur d'une inconnue, substituer cette valeur dans toutes les équations qui renferment cette inconnue : cette opération *élimine* de même l'inconnue.

L'élimination des inconnues se pratiquant jusqu'à ce que l'on arrive à une équation formée toute entière de con-

nues avec une seule inconnue ; il est évident qu'on ne peut la pousser jusqu'au bout, si l'on n'a pas autant d'équations que d'inconnues. En effet, si l'on se propose de trouver deux quantités x, y , dont on ne connoît que la somme a ; la condition unique du problème exprimée par l'équation $x + y = a$, ne permet pas d'éliminer aucune des deux inconnues. Si l'on prend la valeur de x ; par exemple, en la laissant seule dans un membre $x = a - y$, on n'apprend autre chose, sinon qu'elle est égale à une quantité $a - y$, aussi inconnue qu'elle. Ces sortes de problèmes, dans lesquels il y a plus d'inconnues que de conditions, s'appellent des *problèmes indéterminés*. Nous en parlerons dans la suite.

PROBLÈME XI. *Une personne ayant des jetons dans ses deux mains, en prend un de la droite pour l'ajouter à ceux de la gauche ; & par-là il s'en*

trouve autant dans une main que dans l'autre. Si la même personne eût fait passer deux jetons de la gauche dans la droite, cette dernière main eût contenu le double des jetons qui seroient restés dans la gauche. On demande combien de jetons il y avoit d'abord dans chaque main ?

Soient x le nombre des jetons que renfermoit la main droite, y le nombre de ceux de la gauche. La première & la seconde condition donneront les deux équations suivantes :

$$x - 1 = y + 1 \dots x + 2 = 2(y - 2).$$

On pourroit prendre dans la première équation la valeur de x , & la substituer dans la seconde, pour n'avoir plus que y à évaluer : mais il est plus court de soustraire cette première équation de la seconde :

$$\begin{aligned} x + 2 - x + 1 &= 2y - 4 - y - 1, \\ 3 &= y - 5 \dots 8 = y; \end{aligned}$$

& par conséquent $x = 10$. Ces deux nombres satisfont aux conditions du problème.

PROBLÈME XII. *Un Orfèvre a fait payer 318th pour 3 onces d'or & 5 onces d'argent. Il a fait payer aussi 522th pour 5 onces d'or & 7 onces d'argent. A quel prix est l'once d'or? A quel prix est l'once d'argent?*

Soient x & y les valeurs cherchées, $a = 318 \dots b = 522$. Les deux conditions du problème donneront les deux équations suivantes :

$$3x + 5y = a \dots 5x + 7y = b.$$

A cause des coefficients différens qui affectent les mêmes inconnues dans les deux équations, on ne peut en éliminer aucune par la seule addition ou soustraction des deux équations, comme nous l'avons pratiqué ci-dessus. Il faut donc tâcher de donner dans ces deux équations un même coefficient à l'une

des deux inconnues, pour pouvoir ensuite l'éliminer par cette voie. Or pour cela il suffit de multiplier la première équation par le coefficient dont est affectée cette inconnue dans la seconde équation, & de multiplier ensuite la seconde équation par le coefficient dont la même inconnue est affectée dans la première équation.

Veut-on éliminer x des deux équations précédentes, on multiplie la première par 5 (coefficient de x dans la seconde), & la seconde par 3 (coefficient de x dans la première) les produits sont :

$$15x + 25y = 5a \dots 15x + 21y = 3b.$$

En retranchant la seconde de la première, on a.....

$$15x + 25y - 15x - 21y = 5a - 3b,$$

$$4y = 5a - 3b \dots y = \frac{5a - 3b}{4} \dots$$

$$y = \frac{1590 - 1566}{4} \dots y = 6^{\text{th}} \dots$$

& $x = 96^{\text{th}}$. Ces deux prix remplissent les conditions du problème.

Pour résoudre ces sortes de problèmes avec toute la généralité dont ils sont susceptibles, nous exprimerons toutes les quantités du problème par des lettres,

$$px + qy = a \dots mx + ny = b.$$

En multipliant, comme ci-dessus, la première équation par m , & la seconde par p , nous aurons

$$mpx + mqy = am,$$

$$mpx + npy = bp.$$

En soustrayant la seconde de la première, il viendra,

$$mpx + mqy - mpx - npy = am - bp,$$

$$y(mq - np) = am - bp \dots \dots \dots$$

$$y = \frac{am - bp}{mq - np} \dots \dots \dots \text{En substituant}$$

cette valeur de y dans la première équation, on a $x = \frac{bq - an}{mq - np}$.

Si l'on donne aux lettres m, n, p, q les valeurs respectives qu'elles ont dans l'énoncé du dernier problème, on verra que x & y seront respectivement 96^{te} & 6^{te}, comme ci-dessus. Il y aura même cette facilité de plus qu'en variant tant que l'on voudra les valeurs des données, on n'aura que de simples substitutions à faire dans les formules de x & de y , pour résoudre tous les problèmes analogues à celui-là. Voilà pourquoi les solutions générales sont préférables, à tous égards, aux solutions particulières. C'est toujours la même supériorité de l'Algebre sur l'Arithmétique.

PROBLÈME XIII. *On a acheté trois chevaux dont les prix réunis sont tels que le prix du premier, plus la moitié du prix du second & du troisième, sont 25*

louis. Le prix du second, plus le tiers du prix des deux autres font 26 louis, Enfin le prix du troisième, plus la moitié du prix des deux autres font 29 louis. Quel est le prix de chaque cheval ?

Soient x , y & z les trois prix demandés ; on aura pour les trois équations du problème,

$$x + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 25,$$

$$y + \frac{x}{3} + \frac{z}{3} = 26,$$

$$z + \frac{x}{2} + \frac{y}{2} = 29.$$

Faisant disparaître les fractions, éliminant successivement x & y , on parviendrait à une équation qui donneroit la valeur de z . Cette voie, qui d'ailleurs a l'avantage d'être applicable à tous les cas d'élimination, est plus longue.

que la voie par laquelle nous allons conduire nos Calculateurs.

D'abord, pour éviter les fractions, donnons pour coefficient arbitraire aux trois inconnues un nombre dont on puisse prendre la moitié ou le tiers sans fraction, tel que 6. Soient donc $6x$ le prix du premier cheval.... $6y$ le prix du second.....& $6z$ le prix du troisième. Soient ensuite, pour abréger le calcul, $a = 25$ $b = 26$ $c = 29$.

Cela posé, on aura les équations suivantes,

$$\text{I. } 6x + 3y + 3z = a,$$

$$\text{II. } 6y + 2x + 2z = b,$$

$$\text{III. } 6z + 3x + 3y = a,$$

Or si on ajoute la première à la troisième, on aura,

$$\text{IV. } 9x + 6y + 9z = a + c.$$

Et si l'on multiplie cette dernière équation par 2 (coefficient de x & de z dans l'équation II) il viendra

$$V. 18x + 12y + 18z = 2a + 2c.$$

Comparant ce résultat au produit de l'équation II multipliée par 9 (coefficient des mêmes inconnues x & z dans l'équation IV), c'est-à-dire, à.....
 $54y + 18x + 18z = 9b$, on verra que ces deux inconnues y sont affectées du même coefficient. Donc en soustrayant l'équation V de celle-ci, les deux inconnues seront éliminées du même coup. Soustraction faite, il restera

$$VI. 42y = 9b - 2a - 2c.$$

D'où l'on tire tout de suite,

$$6y = \frac{9b - 2a - 2c}{7} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{234 - 50 - 58}{7} = 18 \text{ louis.}$$

C'est le prix du second cheval.

Pour avoir le prix du premier, on substitue la valeur de y dans les équations I & II, ce qui les change en celles-ci :

Cvj

$$6x + 9 + 3z = a,$$

$$2x + 18 + 2z = b.$$

Multipliant la première par 2, & la seconde par 3 (coefficiens respectifs de z), on aura

$$12x + 18 + 6z = 2a,$$

$$6x + 54 + 6z = 3b.$$

Soustrayant la seconde de la première, on obtient... $6x - 36 = 2a - 3b$...
 $6x = 2a - 3b + 36 = 8$ louis, prix du premier cheval... $6z = 16$ louis, prix du troisième cheval. Ces trois nombres 8, 18 & 16, satisfont aux trois conditions du problème, & sont même les seuls qui puissent y satisfaire.

REMARQUE. La résolution du problème V, où il s'agissoit de trois mises, sembloit exiger trois inconnues, comme ce XIII^e problème. Dans le fait, on en seroit venu à bout très-facilement par cette méthode, si la première que

nous y avons suivie n'eût pas été encore plus facile. Voici comme on l'auroit résolu avec trois inconnues.

Soient x, y, z les mises respectives des trois amis, $\dots a = 21 \dots e = 24 \dots f = 27$, comme ci-dessus. On aura par les trois conditions du problème, $x + y = a \dots x + z = e \dots y + z = f$. Prenant dans la première équation $x = a - y$, & substituant cette valeur dans la seconde équation pour éliminer x , on trouvera

$$a - y + z = e.$$

On pourroit ensuite prendre dans ce dernier résultat la valeur de y , & la substituer dans la troisième équation du problème : mais il est plus simple d'ajouter cette équation, $y + z = f$, à celle que l'on vient de trouver.....
 $a - y + z = e$. Par cette addition l'inconnue y est éliminée, & il reste $a + 2z = f + e$; d'où l'on tire.....

$$\text{tire } z = \frac{f+e-a}{2} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{27+24-21}{2} = 15^{\text{te}}.$$

Cette valeur de z substituée dans la seconde équation du problème, donne $x+15=e\dots x=e-15\dots x=9^{\text{te}}$. La substitution de la valeur de x dans l'équation $x+y=a$, ou celle de la valeur de z dans l'équation $y+z=f$, donne aussi-tôt $y=12^{\text{te}}$.

Problèmes du premier degré à résoudre.

N. B. Les solutions de ces problèmes se trouvent à la fin de ce volume.

PROBLÈME A. On demande à un homme combien il a d'écus ? Il répond si vous ajoutez ensemble la moitié, le tiers, & le quart de ce que j'en ai, la somme surpassera de 1 le nombre que vous demandez.

PROBLÈME B. Un père a 50 ans ; son

filz en a 12. Quand est-ce que l'âge du père ne sera que le triple de celui du filz ?

PROBLÈME C. Une personne charitable voulut un jour faire l'aumône à plusieurs pauvres, & donner également à tous. D'abord elle avoit projeté de donner 3 sous à chacun, mais il lui auroit fallu 9 sous de plus : elle ne leur en donna donc que 2, & il lui en resta 2. Combien y avoit-il de pauvres ? Combien cette personne avoit-elle de sous ?

PROBLÈME D. Un ouvrier n'avoit plus que 6^{te} lorsqu'on lui paya cinq semaines de travail. Quinze jours après il avoit déjà dépensé les trois quarts de tout son argent : mais ayant reçu le prix de son travail pour ces quinze jours, il se trouva avoir 21^{te}. Que gagnoit-il par semaine ?

PROBLÈME E. Le testament d'un oncle porte que chacun de ses neveux aura 12000^{te}, & chacune de ses nièces 9000^{te}

sur la somme de 120000^{fr} qu'il leur laisse après sa mort. Par cette disposition, il ne reste rien de cette somme. Si au contraire chaque nièce eut eû 12000^{fr}, & chaque neveu 9000^{fr}, il seroit resté 9000^{fr}. On demande le nombre des neveux & des nièces?

PROBLÈME F. Un chasseur promet à un autre de lui donner une somme b , toutes les fois qu'il manquera une pièce de gibier. Cet autre à son tour s'engage à payer une somme c , toutes les fois qu'il la tuera. Après un nombres n de coups de fusil, il peut arriver, ou que les deux chasseurs ne se doivent rien, ou que le premier soit redevable au second, ou le second au premier d'une quantité d . On demande une formule qui fasse connoître dans les trois cas combien il y a eu de coups manqués?

PROBLÈME G. Une personne ayant doublé au jeu l'argent qu'elle avoit

avant que de jouer, donne un louis à ses domestiques. Gagnant une seconde fois de quoi doubler l'argent qui lui reste, elle met un louis à la loterie qui ne lui rapporte rien. Entrant au jeu pour la troisième fois, & doublant son argent, elle ne se trouve plus avoir qu'un louis dans sa poche. Combien avoit-elle d'argent d'abord?

PROBLÈME H. *A*, *B* & *C* ont chacun un certain nombre d'écus que l'on ne connoît pas; tout ce que l'on en fait se réduit à ceci. *A* distribuant de ses écus à *B* & à *C*, a doublé les nombres respectifs qu'ils en avoient déjà. *B* distribuant à son tour les siens, a doublé ceux qui restoient entre les mains de *A*, & ceux que *C* avoit alors. Enfin *C* a doublé de même ceux que *A* & *B* avoient au moment de sa distribution: & tout cela fait, chacun s'est trouvé en avoir 16. Combien en avoient-ils en commençant?

PROBLÈME I. Deux courriers sont partis au même instant, l'un de Paris pour Fontainebleau, l'autre de Fontainebleau pour Paris. Leurs vîteses sont dans le rapport de 3 à 4; on demande où ils se rencontreront, la distance des deux points de départ étant supposée de 14 lieues. Généraliser le problème.

Résolution des équations du second degré.

Toute équation du second degré peut être représentée par cette formule simple $\dots\dots x^2 + p x = q$, dans laquelle p & q expriment des quantités connues. ($x^2 = q$, rentre dans cette formule, en supposant $p = 0$; parce que le zéro fait évanouir les termes dont il est multiplicateur). Ainsi la résolution de cette équation donnera la résolution de toutes les équations du second degré.

Or il est évident, 1°. que si $p = 0$, l'équation se réduisant à celle-ci.....

$x^2 = q$, auroit pour racines.....

$\pm x = \sqrt{q}$ & par transposition...

$x = \pm \sqrt{q}$. Le radical est affecté du double signe, à cause de la double valeur qui en résulte pour l'inconnue.

2°. Si p a une valeur, il faut extraire la racine quarrée de l'équation.....

$x^2 + px = q$.

Dans le premier cas, c'est l'extraction des racines numériques.

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque p est une quantité réelle, il faut pour pouvoir extraire la racine de l'inconnue, *compléter le quarré du membre de l'équation où elle se trouve*, comme nous l'avons enseigné dans l'*Extraction des Racines*. On doit, pour conserver l'égalité, ajouter à l'autre membre la même quantité qui a été ajoutée au premier pour compléter le quarré. Ainsi, dans l'équation générale

$x^2 + px = q$, on ajoute au premier membre $\frac{1}{4}p^2$ pour compléter le carré; & $\frac{1}{4}p^2$ au second membre pour conserver l'égalité: ce qui donne

$$x^2 + px + \frac{1}{4}p^2 = q + \frac{1}{4}p^2.$$

Maintenant, lorsque deux quantités sont égales, leurs racines de même nom le sont aussi; donc les racines carrées des deux membres d'une équation sont égales aussi; donc.....

$$\sqrt{x^2 + px + \frac{1}{4}p^2} = \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2},$$

& par conséquent.....

$$x + \frac{1}{2}p = \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}.....$$

d'où l'on tire par transposition la formule générale de la racine carrée,

$$x = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}.$$

Toutes les fois que la quantité représentée par q , sera positive, le radical affectera une quantité positive; puisque $\frac{1}{4}p^2$ est nécessairement positif. Ainsi de deux choses l'une, ou la substitution des valeurs de q & de $\frac{1}{4}p^2$ produira un nombre carré, & alors la

quantité soumise au radical sera commensurable ; ou cette substitution donnera un nombre qui ne sera point susceptible d'extraction de racine quarrée exacte , & dans ce cas la quantité radicale sera incommensurable ; alors on ne pourra l'avoir que par approximation ; mais elle sera *réelle* dans les deux cas.

L'ambiguïté du signe $\pm$ fait voir que cette quantité radicale *réelle* peut se prendre également en $+$ & en $-$. Il en résulte donc deux valeurs différentes pour x ; & comme en général les valeurs de l'inconnue s'appellent *les racines de l'équation* , on doit conclure que toute équation du second degré a deux racines. L'une est.....

$$x = -\frac{1}{2}p + \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2} ; \text{ l'autre...}$$

$$x = -\frac{1}{2}p - \sqrt{q + \frac{1}{4}p^2}.$$

Ces racines ne sont pas toujours *réelles* ; souvent elles sont *imaginaires* ; or voici ce qu'on entend par des quantités *imaginaires*.

Supposons que sous le signe radical qui affecte $q + \frac{1}{4}p^2$, la quantité q soit négative. Cette supposition ne peut avoir que trois résultats. Le premier que la quantité q soit moindre que $\frac{1}{4}p^2$; alors le positif l'emportera sur le négatif, & le reste de la soustraction sera réel.

Le second résultat est celui où la quantité négative q seroit égale à la quantité positive $\frac{1}{4}p^2$. Alors le radical disparaîtroit, & la double valeur de x se réduiroit à $-\frac{1}{2}p$; c'est-à-dire, que les deux racines de l'équation.....
 $x^2 + px = q$ seroient égales. Nous retrouverons l'occasion de parler de ces sortes de racines.

Enfin, le troisième résultat est celui où q étant négatif, seroit en même-tems plus grand que $\frac{1}{4}p^2$. Alors la quantité négative surpassant la quantité positive, le reste seroit négatif. Le signe radical affecteroit donc une quantité négative.

Or la racine quarrée d'une quantité négative est imaginaire, c'est-à-dire, qu'il n'est pas possible de trouver une quantité qui multipliée par elle-même, donne un produit négatif. En effet, ou cette quantité seroit positive, ou elle seroit négative; il n'y a pas de milieu. Or dans les deux cas, son quarré doit être positif; donc la racine quarrée d'une quantité négative est impossible. Ainsi $\sqrt{-1} \dots \sqrt{-2} \dots \sqrt{-9} \dots \sqrt{-a} \dots \sqrt{-b^2} \dots \sqrt{-(p^2 + q^2)}$ sont autant de quantités chimériques, ou comme l'on dit ordinairement, toutes ces quantités sont autant d'imaginaires. Au reste, l'usage des imaginaires est fort étendu dans les calculs algébriques.

Après avoir parcouru tous les cas de la résolution générale des équations du second degré, il nous reste à en donner quelques applications; c'est ce que nous allons faire dans les problèmes suivants.

PROBLÈME I. *Trouver un nombre tel, qu'en ajoutant sept fois ce nombre à son quarré, la somme soit 144?*

J'appelle x le nombre demandé; son quarré sera donc x^2 , & la condition du problème sera exprimée par l'équation

$$x^2 + 7x = 144.$$

Complétant le quarré, j'aurai,

$$x^2 + 7x + \frac{49}{4} = 144 + \frac{49}{4};$$

d'où en extrayant la racine quarrée, & transposant, je tirerai

$$x = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{144 + \frac{49}{4}}.$$

Après quoi, réduisant au même dénominateur la quantité qui est sous le signe radical, je trouverai

$$x = -\frac{7}{2} \pm \sqrt{\frac{625}{4}}.$$

Or la racine quarrée de $\frac{625}{4}$ est $\frac{25}{2}$.
Donc $x = -\frac{7}{2} \pm \frac{25}{2}$. Si on prend le signe supérieur +, on aura.....
 $x = -\frac{7}{2} + \frac{25}{2} = 9$. Si on prend le
signe

signe inférieur, on aura $x = -16$. Ainsi le problème dont il s'agit pourra être résolu de deux manières; & en effet, si au carré de 9 qui est 81, on ajoute 7 fois 9 ou 63, la somme sera 144; comme aussi en prenant le carré de -16 , qui est 256, & ajoutant sept fois le nombre -16 (ou plutôt soustrayant sept fois 16) on trouvera 144. Voilà un exemple de la double solution dont les équations du second degré sont susceptibles.

Au lieu de faire tout au long le calcul de ce problème, je n'avois qu'à comparer son équation, $x^2 + 7x = 144$, avec l'équation générale $x^2 + px = q$. J'aurois eu $p = 7$ $q = 144$; & substituant ces valeurs dans la formule $x = -\frac{1}{2}p \pm (q + \frac{1}{4}p^2)$, j'aurois trouvé tout de suite $x = 9$ & $x = -16$. Il est bon de s'accoutumer à ces sortes de comparaisons.

PROBLÈME II. *Trouver un nombre*
Algebre. Tome II. D

tel qu'en soustrayant 2 de son quarré, le reste soit 1.

Si on ne s'appercevoit pas d'abord que cela est impossible, le calcul ne tarderoit pas à en faire sentir l'impossibilité. Commençons par mettre le problème en équation.

Soit x le nombre cherché, & nous aurons $x^2 - 2 = 1$; d'où en transposant nous concludrons $x^2 = 3$, & en extrayant... $x = \pm \sqrt{3}$.

C'est donc la racine quarrée de 3 qui, prise soit en +, soit en —, satisferoit à la condition du problème, & donneroit les deux solutions. Or on fait que cette racine est inassignable.

Pour rapporter cet exemple à la formule $x^2 + px = q$, il faudroit faire $p = 0$... $q = 3$, & alors l'équation... $x = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{(q + \frac{1}{4}p^2)}$ donneroit par les substitutions convenables.... $x = \pm \sqrt{3}$, comme ci-dessus.

PROBLÈME III. *Partager le nombre 10. en deux parties telles que leur produit soit 100.*

Le simple énoncé de ce problème suffiroit pour en faire sentir l'impossibilité; mais en tout cas, le calcul le démontrera.

Soit $a = 10 \dots b = 100 \dots x =$ une des parties cherchées, l'autre sera donc $a - x$, & leur produit sera..... $ax - xx$. On aura donc pour équation du problème.... $ax - xx = b$; & transposant les deux membres, afin de rendre le carré $-xx$ positif, on aura..... $x^2 - ax = -b$.

Comparant cette équation à la formule, on trouvera $p = -a \dots q = -b$. Donc en substituant, on aura $x = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{(-b + \frac{1}{4}a^2)}$, & mettant les valeurs de a & de b , il viendra.. $x = 5 \pm \sqrt{(-100 + 25)} = \dots 5 \pm \sqrt{(-75)}$. Or la racine carrée de toute quantité négative est imagi-

D ij

naire. Donc il est impossible de partager 10 en deux parties assez grandes pour que leur produit donne 100.

Voilà comme l'Algebre résout toutes ces équations. On est sûr d'en trouver la solution, quand il y en a une ; & quand il n'y en a point, l'Algebre le fait connoître ; que peut-on desirer de plus ?

PROBLÈME IV. *Plusieurs personnes voyageant ensemble prirent une voiture qui devoit les conduire à leur destination, moyennant le prix convenu de 342th. Le voyage fait, trois de ces voyageurs s'échappèrent sans payer ; mais ceux qui restèrent, suppléant à ce qui manquoit par la fuite des autres, donnèrent chacun 19th de plus qu'ils n'auroient dû donner. On demande combien il y avoit de voyageurs dans cette voiture ?*

Avant de résoudre ce problème, nous remarquerons que tout cet échaffaudage

de paroles ne sert souvent qu'à embrouiller la question. Commençons donc par la réduire à ses véritables termes.

Un nombre x de personnes doivent payer par égales portions la somme de 342^{fr}. Trois de ces personnes ne payant point leur quote-part, les autres payent pour elles, & il en coûte à celles-ci 19^{fr} de plus. Quel est ce nombre x ?

Il faut d'abord mettre le problème en équation, ce qui ne sera pas difficile pour quiconque réfléchira un peu sur l'unique condition que l'énoncé renferme.

La somme de 342^{fr}, dira-t-on, doit résulter de tout ce que payent les voyageurs qui restent. Or le nombre de ces voyageurs est $x - 3$; la part de chacun n'eût été que de $\frac{342}{x}$, si tous eussent payé : mais comme trois d'entr'eux ne payent point, la part des autres est

augmentée de 19^{te} ; ainsi l'équation du problème est ,

$$\left(\frac{342}{x} + 19 \right) (x - 3) = 342^{\text{te}}.$$

Faisant subir à cette équation les préparations nécessaires, on trouvera....
 $x^2 - 3x = 54$; & comparant ce résultat avec la formule $x^2 + px = q$, on aura $p = -3$ $q = 54$; d'où on tirera $x = -\frac{1}{2}p \pm \sqrt{(q + \frac{1}{4}p^2)} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{(54 + \frac{9}{4})} = \frac{3}{2} \pm \frac{15}{2} = 9$ ou -6 . La première de ces deux solutions est évidemment celle que l'on cherche. La seconde indique seulement que le nombre -6 satisfait aussi à l'équation...
 $x^2 - 3x = 54$. Il y avoit donc neuf voyageurs, dont six, payant 57^{te} chacun, ont formé la somme de 342^{te}.

PROBLÈME V. *Un général voudroit disposer un corps de troupes en bataillon quarré : mais par son premier arrangement, il se trouve avoir 124*

hommes de trop. Faisant une seconde disposition, il essaye de mettre un homme de plus sur chaque ligne, & alors il lui manque 129 hommes pour compléter son bataillon carré. Quel est le nombre des troupes qu'il commande ?

Soit $a = 124 \dots b = 129 \dots x =$ le nombre des soldats placés d'abord sur le front du bataillon ; on aura.....
 $x + 1 =$ le nombre d'hommes qui par le second arrangement forment ce même front. En élevant au carré ces deux expressions, on aura le nombre d'hommes que ces deux bataillons carrés contiendroient. Mais puisque c'est avec le même nombre de troupes que cette double disposition a été faite, il est clair que l'on aura les deux manières suivantes d'exprimer ce nombre, & que de ces deux expressions résultera l'équation du problème ;

$$x^2 + a = (x + 1)^2 - b = x^2 + \dots \\ 2x + 1 - b.$$

A la première inspection, on croiroit que c'est un problème du second degré: mais si on ôte de part & d'autre la quantité x^2 commune aux deux membres, on ne trouvera plus qu'une équation du premier degré à résoudre, & sa réso-

lution donnera... $x = \frac{a + b - 1}{2}$;

formule qui par de simples substitutions fera connoître l'inconnue dans tous les cas semblables. Ici, par exemple, on trouvera que $x = 126$; d'où on conclura $x^2 = 15876$, & par conséquent que $x^2 + a$, ou $15876 + 124 = 16000$. Ce général avoit donc 16000 hommes sous ses ordres.

PROBLÈME VI. *On a divisé le nombre 230 en deux parties, telles que le produit de quatre fois la plus grande par six fois la plus petite donne 144000. Quelles sont ces parties ?*

Soit $a = 230$... $b = 144000$...
 $m = 4$... $n = 6$. Si on appelle x l'une

des deux parties, l'autre sera exprimée par $a - x$, & on aura pour équation générale des problèmes analogues à celui-là :

$$m(a - x)(nx) = b;$$

$$\text{d'où} \dots mnax - mn x^2 = b.$$

Transposant les deux membres, & divisant par mn , on trouvera.....

$$x^2 - ax = -\frac{b}{mn}; \text{ \& comparant}$$

cette dernière équation avec.....

$$x^2 + px = q, \text{ on fera } p = -a \dots$$

$$q = -\frac{b}{mn}; \text{ puis on substituera dans}$$

la valeur générale de $x = \frac{1}{2}p \pm \sqrt{(q + \frac{1}{4}p^2)}$, ce qui donnera.....

$$x = \frac{1}{2}a \pm \sqrt{(-\frac{b}{mn} + \frac{1}{4}a^2)} =$$

$$115 \pm \sqrt{(7225)}, \text{ d'où } x = 200, \text{ ou } = 30.$$

DES RAPPORTS ET DES PROPORTIONS.

Les anciens Mathématiciens rapportoient tous leurs travaux, tous leurs calculs à la Géométrie, ou à la comparaison des lignes, des surfaces & des corps, c'est pourquoi ils imaginèrent des dénominations analogues à cette comparaison. C'est ainsi qu'ils appelèrent *Rapport* ou *Raison arithmétique* la quantité dont une grandeur en surpasse une autre ; & *Rapport* ou *Raison géométrique* le nombre de fois qu'une grandeur en contient une autre. On a conservé ces deux dénominations dont la première est relative à l'addition & à la soustraction ; la seconde à la multiplication & à la division.

Comparant, par exemple, 39 avec 13, pour savoir de combien 39 surpasse 13, on écrit $39 - 13 = 26$. Cette

différence 26, ou cet excès 26 est la *raison arithmétique* de 39 à 13.

Mais en comparant ces deux mêmes nombres 39 & 13, pour savoir combien de fois 39 contient 13, on écrit $\frac{39}{13} = 3$. Ce quotient 3 est la *raison géométrique* de 39 à 13.

REMARQUE. Si l'on eût divisé 13 par 39, c'est-à-dire, $\frac{13}{39} = \frac{1}{3}$, le quotient eût été $\frac{1}{3}$. Or rien n'oblige à diviser plutôt la première quantité par la seconde, que la seconde par la première. Il suffira donc de prévenir ici une fois pour toutes que dans les exemples suivans nous estimerons les rapports géométriques en divisant la seconde quantité par la première.

Toute comparaison suppose au moins deux termes ; & l'on est convenu d'appeler *antécédent* le premier terme, & *conséquent* le second terme de toute raison, soit arithmétique, soit géométrique. Ainsi, tout rapport arithmé-

rique consiste dans la différence qu'il y a entre l'antécédent & le conséquent : de même tout rapport géométrique s'exprime par le quotient d'un de ces deux termes divisé par l'autre.

Lorsque deux quantités ont entr'elles une différence égale à celle qui se trouve entre deux autre quantités , on dit alors que ces quatre termes sont en *proportion arithmétique*. Les nombres 7 & 4, par exemple, diffèrent entr'eux de la même quantité 3, que les nombres 8 & 5 ; ainsi ces quatre nombres sont en proportion ; & pour l'indiquer on est convenu d'écrire ,

$$7.4 = 8.5 ,$$

& plus souvent ,

$$7.4 : 8.5 ;$$

ce qui signifie que le rapport arithmétique de 7 à 4 est égal au rapport arithmétique de 8 à 5 ; ou que 7 est à 4 comme 8 est à 5. Il suit de-là que deux raisons arithmétiques égales forment toujours

toujours une proportion arithmétique.
Voici des exemples de ces proportions,

$$24.12 : 60.48,$$

$$1002.1000 : 2.0,$$

$$18\frac{1}{3}.14\frac{1}{3} : 11.6\frac{1}{3},$$

$$19\frac{1}{3}.23 : 24\frac{1}{3}.28\frac{2}{3},$$

&c.

Lorsque deux quantités divisées l'une par l'autre donnent un quotient égal à celui qui résulte de la division de deux autres quantités, ces quatre quantités sont en *proportion géométrique*. Si on divise, par exemple, 12 par 6, le quotient est 2; & si on divise 18 par 9, le quotient est encore 2. Ainsi les nombres 6, 12, 9 & 18 forment une proportion géométrique que l'on indique des deux manières suivantes,

$$6 : 12 = 9 : 18, \text{ ou } \frac{12}{6} = \frac{18}{9},$$

ou plus souvent,

$$6 : 12 :: 9 : 18,$$

ce que l'on prononce ainsi: 6 est à 12

Algebre. Tome II.

E

comme 9 est à 18.... Concluons donc que deux raisons géométriques égales forment toujours une proportion géométrique.

Exemples. $2 : 6 :: 5 : 15$,

$7 : 63 :: 1 : 9$,

$\frac{5}{17} : \frac{10}{17} :: 1 : 2$, &c.

Le premier & le dernier des quatre termes d'une proportion quelconque s'appellent les *extrêmes*, par comparaison avec le second & le troisième que l'on nomme alors les *moyens*.

Quand on compare deux raisons géométriques ensemble, il arrive deux cas. 1°. Le premier antécédent est à son conséquent comme le second antécédent est à son conséquent; par exemple, $2 : 6 :: 5 : 15$; on dit alors que les deux derniers termes de la proportion sont en *raison directe* (c'est-à-dire, *naturelle*) des deux premiers..... 2°. Il arrive, au contraire, quelquefois que

l'antécédent de la première raison est à son conséquent, comme le conséquent de la seconde est à son antécédent; les quatre nombres suivans sont dans ce cas-là.....13; 26...14; 7... On dit alors que ces deux derniers termes sont en *raison inverse* (ou *renversée*) des deux premiers.

On appelle *proportions continues* toutes celles où le conséquent de la première raison sert d'antécédent à la seconde. Elles sont de deux sortes : les *proportions continues arithmétiques*, & les *proportions continues géométriques*.

Exemple des premières,

$$10.18 : 18.26 ;$$

on écrit pour abréger,

$$\div 10.18.26.$$

Exemple des dernières,

$$6 : 24 :: 24 : 96 ;$$

E ij

on écrit pour abrégé ,

$$\div 6 : 24 : 96.$$

Dans les deux cas , le second terme s'appelle *moyen proportionnel*. Seulement on ajoute le mot *arithmétique* ou *géométrique* , suivant la nature des rapports dont ce terme fait partie.

Quand on écrit plusieurs raisons égales de suite , on a un certain nombre de quantités proportionnelles entr'elles : mais quand le conséquent de la première de ces raisons sert d'antécédent à la seconde , & que le conséquent de la seconde sert d'antécédent à la troisième , & ainsi des autres , la suite de ces raisons égales forme une *progression* , dont l'espèce se détermine par la nature des raisons qui la composent. Voici , par exemple , une *progression arithmétique* ,

$$1.3 : 3.5 : 5.7 : 7.9 : \&c.$$

Pour abrégé , on l'écrit ainsi ,

$$\div 1.3.5.7.9.\&c.$$

La *progression* suivante est *géométrique*,

$$1 : 2 :: 2 : 4 :: 4 : 8 :: 8 : 16 :: \&c.$$

on écrit,

$$\ddot{::} 1 : 2 : 4 : 8 : 16 : \&c.$$

En général, on appelle *progression arithmétique* toute suite de termes qui comparés deux à deux successivement ont entr'eux une même différence : & on appelle *progression géométrique* toute suite de termes tels que la division successive de l'un par l'autre ramène toujours le même quotient.

Des Proportions & Progressions arithmétiques.

Nous avons éprouvé déjà plusieurs fois dans ces Elémens l'utilité des formules générales; c'est pourquoi nous allons en chercher une qui renferme tous les cas des proportions arithmétiques.

Soit la proportion arithmétique....
 $2.4 : 6.8$; ou $2.(2+2) : 6.(6+2)$;
 on peut la traduire ainsi en langage algébrique..... $a.a+d : c.c+d$... où
 a = au premier terme, $b+d$ = au second (c'est-à-dire, au premier + la différence de la raison), c = au troisième, $f+d$ = au quatrième (c'est-à-dire, au troisième + la différence).

Soit la proportion arithmétique....
 $4.2 : 8.6$; ou $4.(4-2) : 8.(8-2)$;
 on peut la traduire ainsi algébriquement..... $a.a-d : c.c-d$.

En réunissant d'une part les deux premières raisons de ces deux proportions, & de l'autre les deux secondes raisons de ces proportions, on aura...
 $a.a \pm d$ & $c.c \pm d$; ou, ce qui revient au même... $a.a \mp d$ & $c.c \mp d$. Ce qui donnera la formule cherchée pour toutes les proportions arithmétiques. Cette formule est,

$$a.a \mp d : c.c \mp d.$$

L'examen de cette formule nous fournit les observations suivantes :

1°. *Dans une raison arithmétique quelconque , l'antécédent diminué ou augmenté de la différence , est égal au conséquent.*

2°. *Dans toute proportion arithmétique , la somme des extrêmes est égale à celle des moyens.* Car en ajoutant les extrêmes de la formule , on aura $a + c \mp d$; & en ajoutant les moyens , on aura de même... $a \mp d + c$, somme égale à la précédente. Cette égalité de somme est la propriété fondamentale de toute proportion arithmétique. Soit $2.4 : 6.8$, on aura $2 + 8 = 4 + 6$. Soit encore $12.10 : 50.18$, on aura..... $12 + 18 = 10 + 20$. Donc , en général , de ce que $a.b : c.d$, on conclura..... $a + d = b + c$.

3°. Si dans une proportion arithmétique , il y a un extrême inconnu , sa valeur se trouvera tout de suite , en

soustrayant l'autre extrême, de la somme des moyens.... *Exemple.* On demande le quatrième terme de la proportion..

17 29 : 13 . x ; on a $17 + x = 29 + 13$;
donc $x = 29 + 13 - 17$, ou.....
 $x = 42 - 17 = 25$.

Si le terme inconnu est un des moyens , pour l'obtenir on retranchera le moyen connu de la somme des extrêmes.

4°. Dans toute proportion arithmétique continue, la somme des extrêmes est double du terme moyen proportionnel. Car on a $a \div x . x . b$, ou $a . x : x . b$; d'où l'on tire $x + x = a + b$, &....

$$2x = a + b \dots x = \frac{a + b}{2} . \text{ Donc}$$

le moyen proportionnel arithmétique entre deux quantités données est égal à la moitié de la somme de ces quantités.

Une progression arithmétique étant toujours une suite de termes entre les-

quels il régné une même différence ; la formule suivante doit représenter toutes ces progressions , car chaque terme y diffère également de celui qui précède... $\div a. a \mp d. a \mp 2 d. a \mp 3 d. a \mp 4 d. a \mp 5 d. \&c. \&c.$

Le signe $-$ est pour les *progressions décroissantes* , & le signe $+$ pour les *progressions croissantes* .

L'examen de cette formule découvre les propriétés suivantes des progressions arithmétiques :

1°. *Dans toute progression arithmétique , la somme des termes également éloignés des extrêmes , est égale à la somme de ces extrêmes , ou à celle des moyens , ou au double du moyen quand le nombre des termes est impair.* Prenons ici pour exemple la somme du second terme $a \mp d$, & de l'avant-dernier $a \mp 4 d$. Cette somme est $2 a \mp 5 d$. Les extrêmes sont a , & $a \mp 5 d$, dont la somme est évidemment la même . Les

moyens sont $a \mp 2d$ & $a \mp 3d$, dont la somme est également $2a \mp 5d$.

On peut vérifier ces résultats sur les nombres suivans ,

$$\div 7.12.17.22.27.32.37.42.47.$$

2°. On voit dans la formule qu'un terme quelconque est égal à la somme du premier terme $\mp$ le produit de la différence commune par le nombre des termes précédens. Donc on peut avoir facilement un terme quelconque d'une progression arithmétique dont on connoît le premier terme a , la différence d , & le nombre n des termes, par le moyen de l'équation suivante où t désigne le terme cherché.....
 $t = a \mp d(n - 1)$. Si l'on cherche, par exemple, le sixième terme de la progression numérique précédente, l'équation *formulaire* deviendra par les substitutions.... $t = 7 + 5(6 - 1)$...
 $t = 7 + 25$Ainsi le sixième terme cherché est 32.

3°. La formule générale fait voir que dans toute progression arithmétique la différence du premier terme au dernier est égale au produit de la différence commune par le nombre de tous les termes moins un. Car. 1°.

$$a - (a - 5d) = a - a + 5d = + 5d;$$

$$\& 2°. \dots\dots\dots$$

$$a - (a + 5d) = a - a - 5d = - 5d.$$

Mais $5d$ est le produit de la différence d par 5 , c'est-à-dire, par le nombre des termes moins un.

Appelant donc le premier terme de toute progression arithmétique croissante a , & le dernier ω (on prononce *oméga*) on aura la formule suivante. .
 $\omega - a = d(n - 1) = dn - d$. Appliquant cette formule à la progression suivante,

$$\div 4.9.14.19.24.29.34.39,$$

on trouve que

$$39 - 4 = 5(8 - 1) = 5 \times 7 = 35.$$

E v j

On peut dire aussi que la somme des termes d'une progression arithmétique est toujours égale à la moitié du produit de la somme des extrêmes par le nombre des termes, ou au produit du terme moyen (si le nombre des termes est impair) par le nombre des termes.

PROBLÈME GÉNÉRAL pour tous les cas des progressions arithmétiques. On suppose que le premier terme soit représenté par a , que le dernier soit représenté par ω (dernière lettre de l'alphabet grec), la différence par d , le nombre des termes par n , & leur somme par s ; & on demande des formules qui fassent connoître immédiatement la valeur de deux quelconques de ces quantités, les trois autres étant supposées connues.

SOLUTION. De l'équation.....
 $\omega - a = dn - d$; on tirera d'abord quatre formules différentes pour les va-

leurs respectives de a , ω , d & n . (Mais avant que d'entrer dans aucun détail, il est à propos de prévenir le Lecteur que ce problème est rarement utile. On peut donc en négliger la solution, & passer tout de suite aux proportions géométriques). Ces quatre formules sont,

$$\text{I. } a = \omega - dn + d,$$

$$\text{II. } \omega = a + dn - d,$$

$$\text{III. } d = \frac{\omega - a}{n - 1},$$

$$\text{IV. } n = 1 + \frac{\omega - a}{d}.$$

De l'équation $2s = an + \omega n$, on tirera ces quatre autres formules,

$$\text{V. } a = \frac{2s}{n} - \omega,$$

$$\text{VI. } \omega = \frac{2s}{n} - a,$$

$$\text{VII. } n = \frac{2s}{a + \omega},$$

$$\text{VIII. } s = \frac{an - \omega n}{2}.$$

Et si dans l'équation $2s = an + \omega n$, vous substituez la valeur de ω prise dans l'équation $\omega - a = dn - d$, vous aurez... $2s = 2an + dnn - dn$, d'où vous tirerez les quatre formules suivantes,

$$\text{IX. } a = \frac{s}{n} - \frac{dn + d}{2},$$

$$\text{X. } d = \frac{2s - 2an}{nn - n},$$

$$\text{XI. } n = \frac{1}{2} - \frac{a}{d} + \sqrt{\left(\frac{2s}{d} + \frac{1}{4} - \dots \frac{a}{d} + \frac{a^2}{d^2}\right)},$$

$$\text{XII. } s = an + \frac{dnn - dn}{2}.$$

Substituant ensuite dans la même équation $2s = an + \omega n$, la valeur de a

prise dans l'équation $\omega - a = dn - d$,
vous trouverez $2s = 2\omega n - dnn + dn$,
équation qui donnera quatre nouvelles
formules.

$$\text{XIII. } \omega = \frac{s}{n} + \frac{dn - d}{2},$$

$$\text{XIV. } d = \frac{2\omega n - 2s}{nn - n},$$

$$\text{XV. } n = \frac{1}{2} + \frac{\omega}{d} + \sqrt{\left(-\frac{2s}{d} + \frac{1}{4} + \frac{\omega}{d} + \frac{\omega^2}{d^2}\right)},$$

$$\text{XVI. } s = \omega n - \frac{dn^2}{2} + \frac{dn}{2}.$$

Substituant enfin dans $2s = an + \omega n$,
la valeur de n prise dans la première
équation, vous aurez

$$2s = a + \omega + \frac{\omega^2 - a^2}{d},$$

d'où se tirent les quatre dernières for-
mules,

$$\text{XVII. } a = \frac{1}{2}d + \sqrt{(-2ds + \frac{1}{4}d^2 + \omega d + \omega^2)},$$

$$\text{XVIII } \omega = -\frac{1}{2}d + \sqrt{(2ds + \frac{1}{4}d^2 + ad + a^2)},$$

$$\text{XIX. } d = \frac{\omega^2 - a^2}{2s - a - \omega},$$

$$\text{XX. } s = \frac{a + \omega}{2} + \frac{\omega^2 - a^2}{2d}.$$

Et si l'on veut disposer ces vingt formules de manière à reconnoître dans l'instant celle qui doit donner la valeur demandée, on peut les arranger de la manière suivante,

Étant donnés	Trouver	FORMULES des Progressions arithmétiques.
a, d, n		$a = a - dn + d,$
a, n, s	a	$a = \frac{2s}{n} - a,$
a, d, s		$a = \frac{1}{4}d + \sqrt{(-2ds + \frac{1}{4}d^2 + nd + a^2)},$
d, n, s		$a = \frac{s}{n} \frac{dn + d}{2},$

a, d, n	$w = a + dn - d,$	
a, n, s	$w = \frac{2s}{n} - a,$	
a, d, s	$w = -\frac{1}{2}d + \sqrt{(2ds + \frac{1}{4}d^2 - ad + a^2)},$	
d, n, s	$w = \frac{s}{n} + \frac{dn - d}{2},$	

Etant donné	Trouver	FORMULES des Progressions arithmétiques.
a, u, n		$d = \frac{u - a}{n - 1},$
a, n, s	d	$d = \frac{2s - 2an}{nn - n},$
a, u, s		$d = \frac{u^2 - a^2}{2s - a - u},$
u, n, s		$d = \frac{2un - 2s}{nn - n},$

a, ω, d		$n = 1 + \frac{\omega - a}{d},$
a, ω, s	n	$n = \frac{2s}{a + \omega},$
a, d, s		$n = \frac{\frac{1}{2}}{a - \frac{a}{d}} + \frac{2s}{d} + \sqrt{\frac{2s}{d} + \frac{a}{d} + \frac{a^2}{d^2}},$
ω, d, s		$n = \frac{\frac{1}{2}}{\omega - \frac{\omega}{d}} + \frac{2s}{d} + \frac{1}{4} + \frac{\omega}{d} + \frac{\omega^2}{d^2} \left(- \frac{2s}{d} + \frac{1}{4} + \frac{\omega}{d} + \frac{\omega^2}{d^2} \right)$

Etant donnés	Trouver	FORMULES des Progressions arithmétiques.
a, w, n		$s = \frac{an + wn}{2},$
a, d, n	s	$s = an + \frac{dnn - dn}{2},$
a, d, w		$s = \frac{a + w}{2} + \frac{w^2 - a^2}{2d},$
w, d, n		$s = wn - \frac{dnn + dn}{2}.$

Applications de ces formules.

PROBLÈME I. On demande la somme des coups frappés par une horloge, à chaque tour du cadran ?

Le nombre des termes n est ici égal à 12, le premier terme $a=1$, & le dernier $\omega=12$. En substituant ces valeurs dans la première formule des va-

leurs de $s \dots s = \frac{an + \omega n}{2}$, on

$$\text{aura} \dots s = \frac{12 \times 1}{2} + \frac{12 \times 12}{2} =$$

$$6 + \frac{144}{2} = 6 + 72 = 78 \text{ coups.}$$

PROBLÈME II. On fait d'après les observations de Galilée, que les espaces parcourus en vertu de la gravité par un corps qui descend du repos, croissent suivant la progression des nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9, &c; c'est-à-

dire , qu'un corps tombant par la seule impression de la gravité parcourt à peu près 15 pieds dans la première seconde suivante , & ainsi de suite. On demande combien il aura parcouru de pieds au bout de six secondes ?

Ce problème se réduit à trouver la somme d'une progression arithmétique dont le premier terme $a = 15$ pieds, dont la différence $d = 30$, & dont le nombre des termes $n = 6$. On le résoudra donc par la seconde formule des valeurs de s $s = an +$

$$\frac{(dn - d)n}{2} = 90 + \dots\dots\dots$$

$$\frac{(180 - 30)6}{2} = 540 \text{ pieds.}$$

PROBLÈME III. Un voyageur voudroit arriver en 4 jours à sa destination, en accélérant chaque jour sa marche de 3 lieues. Pour exécuter son dessein, il est obligé de faire 29 lieues $\frac{1}{2}$ le dernier

nier jour, on demande combien il en a fait le premier jour ?

Ce problème se résout par la formule qui donne la valeur de a , quand on connoît ω , d & n . On a donc.....

$$a = \omega - dn + d = 29\frac{1}{2} - 3 \times 4 + 3 = 20\frac{1}{2} \text{ lieues pour le premier jour.}$$

La formule... $s = \omega n - \frac{dnn + dn}{2}$

donneroit la longueur de sa route....

$$s = 1180 - \frac{3 \times 16 + 3 \times 4}{2} = 100$$

lieues.

PROBLÈME IV. Si on eût demandé en combien de jours ce voyageur auroit parcouru les 100 lieues, en faisant 20 lieues $\frac{1}{2}$ le premier jour, 3 de plus le jour suivant, & ainsi de suite, on se feroit servi de la formule qui donne la valeur de n , quand a , d , s sont connus. Cette formule est.....

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{1}{2} - \frac{a}{d} + \sqrt{\left(\frac{25}{d} + \frac{1}{4} - \frac{a}{d} + \frac{a^2}{d^2} \right)} = \frac{1}{2} - \frac{41}{6} + \dots\dots\dots \\
 &\sqrt{\left(\frac{200}{3} + \frac{1}{4} - \frac{41}{6} + \frac{1681}{36} \right)} = -\frac{38}{6} + \\
 &\sqrt{\left(\frac{4090 - 246}{36} \right)} = -\frac{38}{6} + \\
 &\frac{62}{6} = \frac{24}{6} = 4 \text{ jours.}
 \end{aligned}$$

PROBLÈME V. Une personne a été mise à l'amende pendant plusieurs mois de suite. Elle a payé 6^{tt} pour le premier mois, & 102^{tt} pour le dernier. Chaque mois l'amende étoit plus forte de 12^{tt}. Combien de mois l'a-t-elle payée ?

On connoît $a = 6^{\text{tt}}$, $\omega = 102^{\text{tt}}$, $d = 12^{\text{tt}}$, & l'on cherche n . On prendra donc la formule suivante,

$$n = 1 + \frac{\omega - a}{d} = 1 + \frac{102 - 6}{12} = 9;$$

& l'on trouvera que l'amende a été payée pendant 9 mois.

PROBLÈME VI. Dans un amas de boulets de canon disposés en progression arithmétique croissante, on suppose, 1°. qu'il y a dix-huit rangs dont chacun soit formé par un nombre de boulets plus grand de 2 que celui qui le précède; 2°. Qu'il y ait en tout 360 boulets. On demande combien il'y en a dans le dernier rang?

Puisque l'on connoît d, n, s , on aura

$$s = \frac{s}{n} + \frac{d(n-1)}{2} = 20 + 17 =$$

37 boulets.

PROBLÈME VII. Les mêmes choses étant données que dans le problème précédent, combien y a-t-il de boulets dans la première rangée?

$$\text{Réponse. } a = \frac{s}{n} - \frac{d(n-1)}{2} =$$

20 — 17 = 3 boulets.

PROBLÈME VIII. Etant donnés deux termes a & u , comment insérer entre

F ij

eux un des moyens proportionnels, de manière qu'il résulte du tout une progression arithmétique? On voudroit, par exemple, intercaler six termes proportionnels arithmétiques entre 4 & 32?

Ce problème sera résolu, dès que l'on aura trouvé la différence de la progression cherchée; parce qu'en l'ajoutant au premier terme qui est donné, on aura le second; en l'ajoutant au second, on aura le troisième, &c. C'est donc ici uniquement d que l'on cherche, & l'on connoît a & ω . Ainsi l'on

emploiera la formule $d = \frac{\omega - a}{n - 1}$,

dans laquelle $n - 1$ deviendra le nombre de termes donnés, $m + 1$; puisque $n = m + 2$, & que dès-lors $n - 1 = m + 1$. En substituant donc dans la formule précédente $m + 1$ à son égal $n - 1$; on aura la nouvelle formule

$d = \frac{u - a}{m + 1}$, qui résoudra les problèmes de cette sorte.

Dans ce cas on a $d = \frac{32 - 4}{6 + 1} = \frac{28}{7} = 4$. Ainsi la progression deman-

dée sera $\div 4.8.12.16.20.24.28.32$.

PROBLÈME IX. Entre 13 & 7 on voudroit insérer quatre termes qui fissent une progression arithmétique ?

En se servant de la formule préparée dans le problème précédent, on aura $u = 13$, parce que la progression étant décroissante, on renverse l'ordre des termes..... $a = 7$ $m = 4$

$d = \frac{u - a}{m + 1} = \frac{13 - 7}{5} = \frac{6}{5}$. Cette

différence est soustractive, parce que la progression est décroissante. Ainsi l'on aura

$\div 13.11\frac{4}{5}.10\frac{3}{5}.9\frac{2}{5}.8\frac{1}{5}.7$.

F iij

REMARQUE. La formule prise dans le sens direct nous auroit appris par le signe de la différence, que celle-ci étoit soustractive. Soient... $a=13$... $b=7$... $m=4$. La formule deviendra par les substitutions.....

$$d = \frac{7-13}{5} = \frac{-6}{+5} = -\frac{6}{5}.$$

DES PROPORTIONS ET PROGRESSIONS GÉOMÉTRIQUES.

Cherchons une formule qui renferme tous les cas des proportions géométriques. Soient $2 : 4 :: 6 : 12$. Le quotient de chacune des deux raisons qui forment cette proportion est $2=q$. On pourra donc convertir cette proportion en cette autre,.... $\frac{4}{2} : 4 :: \frac{12}{2} : 12$, ou en celle-ci,.... $2 : 2 \times 2 :: 6 : 6 \times 2$, que l'on traduit algébriquement... $a : aq :: c : cq$.

L'examen de la formule générale des

proportions géométriques.....
 $a : aq :: c : cq$ donnera les résultats
 suivans :

1°. *Dans toutes les raisons géométriques le conséquent est égal à l'antécédent multiplié par le quotient qui exprime le rapport de ces deux termes.* Ainsi dans $4 : 8$ $8 = 4 \times 2$. (Ceci est vrai généralement ; parce que si l'on a $8 : 4$, on peut renverser cette raison, & dire $4 : 8$, sans changer le quotient qui est 2 pour les deux raisons.)

2°. *Dans toute proportion géométrique le produit des extrêmes est égal au produit des moyens.* Ainsi dans la formule.... $a : aq :: c : cq$ on aura $a \times cq = aq \times c$, ou $acq = aqc$. Dans la proportion... $2 : 4 :: 6 : 12$, on aura..... $2 \times 12 = 4 \times 6$. Cette propriété fondamentale des proportions géométriques est remarquable par l'usage continuel que l'on en fait dans toutes les parties des Mathématiques.

3°. Il s'agit de la propriété fondamentale qui vient d'être expliquée, qu'il est aisé de trouver le quatrième terme d'une proportion dont on connoît les trois autres. Si le terme inconnu est un extrême, comme dans cette proportion.... $a : b :: c : x$, on aura tout de suite, $ax = bc$, & par conséquent

$$x = \frac{bc}{a} \dots \text{s'il est un des moyens,}$$

comme dans cette proportion..... $a : y :: c : d$, on aura tout de même, $ad = cy$, & $y = \frac{ad}{c}$. Donc un

terme quelconque d'une proportion géométrique est égal, si c'est un moyen, au produit des extrêmes divisé par l'autre moyen; & si c'est un extrême, il est égal au produit des moyens divisé par l'autre extrême. Les Arithméticiens appellent cette opération la Règle de Trois.

Exemples. On demande le quatrième terme de la proportion... $3 : 18 :: 5 : x$.

Faites $3x = 18 \times 5$, & concluez que

$$x = \frac{18 \times 5}{3} = 6 \times 5 = 30.$$

On demande le troisième terme de la proportion... $7 : 63 :: x : 18$.

Vous aurez... $7.18 = 63x$; donc

$$x = \frac{7.18}{63} = 2.$$

4°. De la propriété fondamentale des proportions, il suit que *de toute proportion géométrique représentée par celle-ci... $a : b :: c : d$, on peut toujours tirer une équation, qui est ici $ad = bc$. Réciproquement, d'une équation quelconque on peut toujours déduire une proportion.* On a souvent besoin de ces transformations; c'est pourquoi nous en allons donner ici plusieurs exemples. Si on a... $mn = pq$, on conclura que... $m : p :: q : n$; pro-

portion bien juste (de même que les suivantes), puisque le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Si on avoit.... $a^2 - x^2 = b^2 - y^2$; on en déduiroit, $a + x : b + y :: b - y : a - x$. Etant donnée l'équation.... $1 - z^2 = d$, on trouveroit..... $1 + z : d :: 1 : 1 - z$. A-t-on l'équation.... $a + d = c - x$, on en déduit,.... $a + d : 1 :: c - x : 1$.

De l'équation $\frac{a}{d} = \frac{b}{c}$, on tire...

$a : b :: \frac{1}{c} : \frac{1}{d}$. Enfin de l'équation

$xy = 1$, on déduit $x : 1 :: 1 : y$, proportion géométrique continue, puisque le même terme est à-la-fois conséquent de la première raison, & antécédent de la seconde.

5°. Dans toute proportion géométrique continue, le produit des extrêmes est égal au quarré du moyen pro-

portionnel. Car si l'on a... $2 : 8 :: 8 : 32$, ou (comme on l'écrit ordinairement) $\div 2 : 8 : 32$; on déduira... $2 \times 32 = 8 \times 8 = 8^2$. Donc *pour insérer un moyen proportionnel géométrique entre deux quantités connues, il faut extraire la racine quarrée du produit de ces deux quantités.* Ainsi..... $\div 3 : x : 12$; d'où il suit que $x^2 = 36$ & $x = \sqrt{36} = 6$.

6°. La propriété fondamentale des proportions géométriques permet de faire subir à quatre grandeurs proportionnelles tous les changemens qui ne détruisent pas l'égalité entre le produit des extrêmes & celui des moyens. On peut donc, 1°. *mettre les extrêmes à la place des moyens* (inversion exprimée dans plusieurs ouvrages par le mot *invertendo*) : 2°. *mettre un moyen à la place de l'autre moyen, ou un extrême à la place de l'autre extrême* (changement exprimé par le mot *al-*

ternando). Si on a, par exemple, $a:b::c:d$, aucune des inversions ou permutations suivantes ne troublera l'égalité des deux rapports,

$$b:a::d:c \quad b:d::a:c \quad d:b::c:a, \\ a:c::b:d \quad c:a::d:b \quad c:d::a:b;$$

car on voit que toutes ces proportions donnent également $ad=bc$. 3°. Former une infinité d'autres proportions par voie d'addition, de soustraction, de multiplication, &c. pourvu que l'on fasse toujours les mêmes opérations sur deux raisons égales. Si, par exemple, $a:b::c:d$, on a de même,

$$a \pm b : b :: c \pm d : d ; \\ \text{ou } a : a \pm b :: c : c \pm d.$$

$$a \pm b : a \mp b :: c \pm d : c \mp d, \\ na : b :: nc : d.$$

$$\frac{a}{b} : b :: \frac{c}{b} : d, \text{ ou } a : \frac{b}{m} :: c : \frac{d}{m} . \&c.$$

4°. On a aussi $a^m : b^m :: c^m : d^m \dots$

$a^{\frac{1}{n}} : b^{\frac{1}{n}} :: c^{\frac{1}{n}} : d^{\frac{1}{n}}$. Car si $ad = bc$,
on aura toujours $a^m d^m = b^m c^m$, &

$a^{\frac{1}{n}} d^{\frac{1}{n}} = b^{\frac{1}{n}} c^{\frac{1}{n}}$. Donc en général, toutes
les fois que l'on a des quantités pro-
portionnelles entr'elles, leurs puissan-
ces de même nom sont proportionnelles
aussi : de même des racines de même
nom ; car les racines sont des puissances
fractionnaires.

7°. Il suit que si on a deux propor-
tions géométriques représentées,

l'une, par..... $a : aq :: c : cq$,

l'autre, par..... $g : gp :: h : hp$,

leurs produits, terme par terme, sont
aussi proportionnels ; de sorte que l'on
aura,

$$ag : agpq :: ch : chpq.$$

Il suffit, pour s'en convaincre, de com-
parer le produit des extrêmes avec
celui des moyens. D'ailleurs pq est le

quotient des deux conséquens divisés par leurs antécédens; donc les deux raisons sont égales. Pareillement, si on divise les quatre termes d'une proportion par les quatre termes d'une autre, les quotiens seront en proportion.

8°. Soit une suite de termes proportionnels représentée par.....

$a : aq :: c : cq :: e : eq :: g : gq$; on a remarqué qu'il régnoit un même quotient q entre la somme des antécédens $a + c + e + g$ de cette formule, & la somme des conséquens.....

$aq + cq + eq + gq$, qu'entre un antécédent quelconque a , & son conséquent aq , ou même qu'entre un nombre quelconque de ces antécédens, & le même nombre de conséquens. Et de cette remarque on a conclu que *dans une suite de raisons géométriques égales, quelles qu'elles soient, la somme des antécédens est à la somme des conséquens, comme un seul an-*

recèdent est à son conséquent ; ou comme un nombre quelconque d'antécédens est au même nombre de conséquens.

On pourroit dire aussi que cette proportion a lieu généralement dans tous les cas semblables , puisque le produit des extrêmes est égal au produit des moyens dans la formule suivante qui peut représenter tous les cas pareils :

$$a + c + e + g : (a + c + e + g) q :: a : a q :: a + c + e : (a + c + e) q.$$

Ici nous remarquerons , 1°. qu'étant donné une raison géométrique quelconque , on peut en former une suite d'autres qui lui seront parfaitement égales , soit en multipliant , soit en divisant ces deux termes par une même quantité. Car soit $a : a q$ la raison donnée ; soit m le multiplicateur de ces deux termes , on aura pour produit $a m$ & $a m q$, qui ont visiblement entre eux le même rapport q qui existoit entre a & $a q$.

Si on eut divisé par n ces deux termes, les quotiens $\frac{a}{n}$ & $\frac{aq}{n}$ au-

roient eu pareillement le même rapport q . *Une raison géométrique ne change donc pas de valeur, soit que l'on multiplie, soit que l'on divise ses deux termes par une même quantité.*

Or, toute fraction peut être regardée comme une raison géométrique. Il est donc démontré (ce que nous n'avons pu qu'insinuer dans la théorie des fractions) que la multiplication ou la division des deux termes d'une fraction quelconque par une même quantité, n'altère jamais la valeur de cette fraction.

9°. Et de-là il suit évidemment que *deux quantités quelconques ont entre elles le même rapport, que leurs moitiés, leurs tiers, leurs quarts, & toutes leurs parties semblables.* Ainsi on a toujours :

$$a:b::\frac{1}{2}a:\frac{1}{2}b::\frac{1}{10}a:\frac{1}{10}b::\frac{1}{p}a:\frac{1}{p}b.$$

Nous remarquerons, 2°. que l'on appelle en général *raison composée*, le rapport des produits de deux ou de plusieurs raisons géométriques quelconques, multipliées antécédent par antécédent, & conséquent par conséquent. On dit, par exemple, que la raison de $mnp:qrs$ est une raison composée de trois *raisons simples*.... $m:q$ $n:r$ $p:s$ qui peuvent être mises aussi sous cette forme.... $\frac{m}{q}$, $\frac{n}{r}$, $\frac{p}{s}$.

Mais quand une raison est composée de deux raisons égales, on dit alors que c'est une *raison doublée*. Ainsi la raison de $ab:abqq$ est la raison doublée des raisons simples & égales de $a:aq$ & de $b:bq$. Quand il y a trois raisons égales, le rapport des produits respectifs s'appelle une *raison triplée*, &c.

Or la raison doublée de deux autres est égale à celle des quarrés d'une quelconque de ces raisons. Et la raison triplée est la même que celle des cubes d'une des trois raisons qui lui servent de facteurs. Car soient les deux raisons égales... $a : a q$ & $b : b q$; il est évident que la raison doublée $ab : ab q^2$ est exprimée par le même quotient q^2 , que la raison des quarrés $a^2 : a^2 q^2$ des deux premiers termes, ou celle de $b^2 : b^2 q^2$, quarré des deux derniers.

Ce qui regarde l'égalité de la raison triplée à celle des cubes d'une des trois raisons simples, se démontre de la même manière.

Propriétés des Progressions géométriques.

Pour trouver les propriétés des progressions géométriques, construisons une formule qui représente toutes les progressions de cette espèce.

Remarque. Ce que nous allons dire des progressions croissantes, pourra s'appliquer également aux progressions décroissantes, en observant alors d'appeler le premier terme ω , & le dernier α .

On fait qu'une progression géométrique est une suite de termes qui tous, à l'exception du premier & du dernier, sont alternativement antécédens & conséquens d'une suite de raisons égales. Or l'égalité de ces raisons se manifeste par l'identité du quotient qui les exprime. Donc la formule suivante peut représenter toute progression géométrique.

$$\div a : aq : aq^2 : aq^3 : aq^4 : aq^5 : aq^6 \dots aq^n .$$

Dans cette formule, on voit que les exposans de q sont en progression arithmétique, puisqu'à cause de $q^0 = 1$, on peut y faire ce léger changement :

$$\div aq^0 : aq^1 : aq^2 : aq^3 : aq^4 : aq^5 \dots aq^n .$$

G iv

On voit aussi qu'en faisant $a = 1$, cette dernière formule devient,

$$q^0 : q^1 : q^2 : q^3 : q^4 \dots q^n ;$$

& qu'alors elle exprime la suite des puissances entières d'une quantité quelconque q . Ainsi les puissances successives & entières d'une même quantité forment toujours une progression géométrique. Il n'en est pas de même des puissances successives & fractionnaires, parce que leurs exposans $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, &c. ne sont pas en progression géométrique.

10°. En général, toutes les fois que les exposans de diverses puissances même quantité sont en progression d'une arithmétique, les termes affectés de ces exposans sont en progression géométrique.

EXEMPLES. $\therefore q^2 : q^5 : q^8 : q^{11} : q^{14}$, &c.
 $\therefore b : b^3 : b^5 : b^7 : b^9$; la même chose se démontre également par la formule
 $\therefore aq^m : aq^{m+1} : aq^{m+2} : aq^{m+3}$, &c.
 dont les exposans sont en progression

arithmétique quelconque, & dont les termes sont évidemment en progression géométrique, puisqu'il règne entr'eux un même quotient q^d .

11°. Reprenant la formule générale $a : aq : aq^2 : aq^3 : aq^4$, &c, nous observerons que le produit de deux termes également éloignés des extrêmes, y est égal au produit des extrêmes, lequel à son tour est égal au produit des moyens, si le nombre des termes est pair, ou au carré du moyen, si le nombre des termes est impair. Car $aq \times aq^3 = a \times aq^4 = aq^2 \times aq^2$; donc toutes les progressions géométriques ont la même propriété.

Et puisque les proportions continues ne sont que des progressions de trois termes, nous concluons généralement, comme nous l'avons déjà fait, que *dans toute proportion géométrique continue, le produit des extrêmes est égal au carré du moyen proportionnel.*

G v.

12°. Considérant la même formule, nous observerons aussi que son premier terme est au troisième, comme le carré du premier est au carré du second : puisque l'on a $a : aq^2 :: a^2 : a^2q^2 :: \&c.$ Cette propriété a donc lieu dans toutes les progressions géométriques.

On a pareillement.....
 $a : aq^3 :: a^3 : a^3q^3$. Donc le premier terme d'une progression géométrique quelconque est au quatrième, comme le cube de ce premier terme est au cube du second.

En général, *deux termes quelconques de cette formule sont entr'eux comme le premier & le second élevés à la puissance marquée par l'intervalle qui sépare les deux termes dont il s'agit.*

13°. Dans la formule des progressions, on voit qu'un terme quelconque est égal au produit du premier par le quotient élevé à une puissance marquée

par le nombre des termes précédens. Le fixième terme, par exemple, aq^5 , n'est autre chose que le produit du premier terme a par le quotient q élevé à la cinquième puissance. Appelant donc t le terme que l'on cherche, & désignant par n le nombre de tous les termes de la progression, on aura généralement... $t = aq^{n-1}$. Cette formule nous sera bientôt utile; mais pour rendre son utilité plus directe, nous mettrons ω (dernière lettre de l'alphabet grec que l'on prononce *oméga*) à la place de t , & nous aurons.... $\omega = aq^{n-1}$.

De ce qui précède on déduit la valeur s des termes d'une progression géométrique quelconque, dont on connoit le premier terme a , le dernier ω , & le quotient q . En effet, tous les termes d'une progression, hors le dernier, étant antécédens, on peut représenter la somme des antécédens par l'expression $s - \omega$; & tous les termes de

cette même progression, hors le premier, étant conséquens, la somme des conséquens peut être représentée par l'expression $s - a$. Mais nous savons que dans une suite de raisons géométriques égales, & par conséquent dans toute progression géométrique la somme des antécédens est à la somme des conséquens, comme un antécédent quelconque est à son conséquent. On a donc... $s - \omega : s - a :: a : aq$; d'où l'on tire d'abord... $saq - a\omega q = sa - aa$; puis.... $sq - \omega q = s - a$; ensuite... $sq - s = \omega q - a$; enfin.....

$$s = \frac{\omega q - a}{q - 1}.$$

N. B. Cette formule.....

$$s = \frac{\omega q - a}{q - 1} \text{ jointe à la précédente}$$

$\omega = aq^{n-1}$ servira à résoudre pour les progressions géométriques un *problème général* analogue à celui que

nous avons déjà résolu pour les progressions arithmétiques : mais pour en saisir tous les résultats , il faut avoir lu auparavant ce qui a rapport aux logarithmes & aux équations des degrés supérieurs. On peut donc passer au chapitre suivant quand on ne connoît pas ces deux théories.

Problème général pour tous les cas des progressions géométriques.

Etant données dans une progression géométrique trois des quantités suivantes , a le premier terme , ω le dernier , n le nombre des termes , s leur somme , q le quotient , trouver immédiatement l'une des deux autres.

La première formule , $\omega = a q^{n-1}$, en donne trois autres , de sorte que l'on

$$I^o. \omega = a q^{n-1} .. II^o. a = \frac{\omega}{q^{n-1}} ..$$

$$III^o. q = \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} ..$$

IV°. $\frac{\omega}{a} = q^{n-1}$, puis *Logarithme*
de ω , ou $L. \omega - L. a = (n-1) L. q$,
 enfin.... $n = 1 + \frac{L. \omega - L. a}{L. q}$.

La seconde formule, $s = \frac{\omega q - a}{q - 1}$,

en donne trois nouvelles, & l'on a...

V°. $s = \frac{\omega q - a}{q - 1}$

VI°. $s q - s = \omega q - a$, puis.....
 $a = \omega q - s q + s$

VII°. $s q - s + a = \omega q$; puis.....
 $\omega = s - \frac{s + a}{q}$

VIII°. $s q - \omega q = s - a$; puis.....
 $q = \frac{s - a}{s - \omega}$.

Substituant dans la seconde formule
 la valeur de ω prise dans la première,

on trouvera... $aq^{n-1} = s - \frac{s+a}{q}$,

ou... $aq^{n-1} \times q = sq - s + a$...

ou $aq^{n-1} + 1 = sq - s + a$... ou

$aq^n - a = sq - s$ ou

$a(q^n - 1) = s(q - 1)$. D'où l'on tire

facilement... IX°... $s = a \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right)$.

X°... $a = s \left(\frac{q - 1}{q^n - 1} \right)$

XI°... $q^n - 1 = s \left(\frac{q - 1}{a} \right)$

ou $q^n = 1 + s \left(\frac{q - 1}{a} \right)$

ou $q^n = \frac{a + sq - s}{a}$ ou

$nL.q = L.(sq - s + a) - L.a$...

& enfin... $n = \frac{L.(sq - s + a)}{L.q}$..

XII°... $q^n - \frac{s}{a}q + \frac{s}{a} - 1 = 0$.

Si on substitue dans la seconde formule la valeur de a prise dans la pre-

mière, on aura $\frac{\omega}{q^n - 1} = \omega q - s q + s$,

ou $\omega q - \frac{\omega}{q^n - 1} = s q - s$, ou...

$\frac{\omega q^n - \omega}{q^n - 1} = s(q - 1)$, ou.....

$\omega \left(\frac{q^n - 1}{q^n - 1} \right) = s(q - 1)$, ... d'où

l'on tire.....

XIII°. $s = \frac{\omega}{q - 1} \left(\frac{q^n - 1}{q^n - 1} \right)$, ..

ou.... $s = \frac{\omega}{q^n - 1} \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right)$...

XIV°. $\omega = s(q - 1) \times \left(\frac{q^n - 1}{q^n - 1} \right)$,

ou $\omega = s q^n - 1 \left(\frac{q - 1}{q^n - 1} \right)$

XV°. Ayant... $\frac{\omega}{q^n - 1} = \omega q - s q + s,$

on a $\omega = q^n - 1 (\omega q - s q + s) \dots$

ensuite $\frac{\omega}{\omega q - s q + s} = q^n - 1 \dots$

puis $L. \omega - L. (\omega q - s q + s) = \dots$
 $(n - 1) L. q \dots$ enfin

$n = 1 + \frac{L. \omega - L. (\omega q - s q + s)}{L. q}.$

XVI°. De l'équation XIV^e.....

$\omega = s q^n - 1 \left(\frac{q - 1}{q^n - 1} \right),$ on tire..

$\omega q^n - \omega = s q^n - s q^n - 1 \dots$ puis

$s q^n - \omega q^n - s q^n - 1 + \omega = 0 \dots$

ensuite $(s - \omega) q^n - s q^n - 1 + \omega = 0,$

enfin $\dots q^n - \frac{s}{s - \omega} q^n - 1 +$

$\frac{\omega}{s - \omega} = 0.$

Enfin substitution faite dans la seconde formule de la valeur de.....

$q = \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}}$ prise dans la première,

on aura..... $s(q-1) = \omega q - a$

où $s \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} - s = \omega \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} - a$.

Mais on fait que $\sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} = \dots\dots\dots$

$\left(\frac{\omega}{a}\right)^{\frac{1}{n-1}}$; & que $\omega \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} =$

$\sqrt[n-1]{\frac{\omega \times \omega^{n-1}}{a}} = \dots\dots\dots$

$\sqrt[n-1]{\frac{\omega^n}{a}} = \frac{\omega^{\frac{n}{n-1}}}{a^{\frac{1}{n-1}}}$. D'après cela

l'équation $s \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} - s = \dots\dots\dots$

$\omega \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} - a$ devient.....

$$s \left(\frac{\omega}{a} \right)^{\frac{1}{n-1}} - s = \frac{\omega^{\frac{n}{n-1}}}{a^{\frac{1}{n-1}}} - a \dots$$

$$s \omega^{\frac{1}{n-1}} - s a^{\frac{1}{n-1}} = \omega^{\frac{n}{n-1}} - \dots$$

$$a \times a^{\frac{1}{n-1}} \dots$$

$$\text{XVII}^\circ. s = \frac{\omega^{\frac{n}{n-1}} - a^{\frac{n}{n-1}}}{\omega^{\frac{1}{n-1}} - a^{\frac{1}{n-1}}} \dots$$

$$\text{XVIII}^\circ. s \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} - s = \dots$$

$$\omega \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} - a \dots s \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} - \dots$$

$$\omega \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} = s - a \dots$$

$$(s - \omega) \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} = s - a \dots$$

$$\sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}} = \frac{s - a}{s - \omega} \dots$$

$$\frac{L. \omega - L. a}{n - 1} = L. (s - a) - L. (s - \omega).$$

$$n = 1 + \frac{L. \omega - L. a}{L. (s - a) - L. (s - \omega)}.$$

XIX°. De ce que $s \omega^{\frac{1}{n-1}} = s a^{\frac{1}{n-1}} =$

$\omega^{\frac{n}{n-1}} = a \times a^{\frac{1}{n-1}} \dots \dots$. Il suit que

$$s \omega^{\frac{1}{n-1}} = \omega^{\frac{n}{n-1}} = s a^{\frac{1}{n-1}} = \dots \dots$$

$$a \times a^{\frac{1}{n-1}}. \text{ Mais } \omega^{\frac{n}{n-1}} = \omega \times \omega^{\frac{1}{n-1}}.$$

C'est pourquoi l'équation précédente

$$\text{devient } \dots s \omega^{\frac{1}{n-1}} = \omega \times \omega^{\frac{1}{n-1}} = \dots$$

$$s a^{\frac{1}{n-1}} = a \times a^{\frac{1}{n-1}} \dots \dots \dots \text{ ou}$$

$$(s - \omega) \omega^{\frac{1}{n-1}} = (s - a) a^{\frac{1}{n-1}} \dots \dots$$

$$\text{XX°. } (s - a) a^{\frac{1}{n-1}} = (s - \omega) \omega^{\frac{1}{n-1}}.$$

On peut maintenant disposer ces vingt formules en Table, comme nous

l'avons déjà fait pour les progressions arithmétiques.

Étant donnés	Trouver	<i>Formules des Progressions géométriques.</i>
ω, q, n	a	$a = \frac{\omega}{q^n - 1},$
ω, s, n		$(s - a) \frac{1}{a^n - 1} = (s - \omega) \frac{1}{\omega^n - 1},$
ω, q, s		$a = \omega q - s q + s,$
q, n, s		$a = s \left(\frac{q - 1}{q^n - 1} \right).$

a, q, n	$\omega = a q^{n-1},$	
$a, s, n,$	$(s-\omega) \frac{1}{\omega^{n-1}} = (s-a) \frac{1}{a^{n-1}},$	
a, q, s	$\omega = s \frac{s+a}{q},$	
q, n, s	$\omega = s q^{n-1} \left(\frac{1-b}{1-b} q^{n-1} \right)$	

Et on donné	Trouver	FORMULES des Progressions géométriques.
a, ω, n	q	$d = \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}},$
a, n, s		$q^n - \frac{s}{a} q + \frac{s}{a} - 1 = 0,$
a, ω, s		$q = \frac{s-a}{s-\omega},$
n, ω, s		$q^n - \frac{s}{s-\omega} q^{n-1} + \frac{\omega}{s-\omega} = 0.$

a, ω, q		$n = 1 + \frac{L. \omega - L. a}{L. q},$
a, ω, s	n	$n = 1 + \frac{L. \omega - L. a}{L. (s - a) - L. (s - \omega)},$
a, q, s		$n = \frac{L. (sq - s + a) - L. a}{L. q},$
ω, q, s		$n = 1 + \frac{L. \omega - L. (\omega q - sq + s)}{L. q}.$

Étant donnés	Trouver	<i>Formules des Progressions géométriques.</i>
a, ω, n		$s = \frac{\frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} - \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1}}{\frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} - \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1}},$
a, q, n	s	$s = a \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right),$
a, ω, q		$s = \frac{\omega q - a}{q - 1},$
ω, n, q		$s = \frac{\omega}{q^n - 1} \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right).$

Applications de ces formules.

PROBLÈME I. On a tiré à cinq reprises différentes du vin d'un tonneau en suivant une progression géométrique croissante, dont le dernier terme est 243 pintes, & dont le quotient est 3. Combien de pintes a-t-on tiré la première fois ?

Soit $\omega = 243 \dots q = 3 \dots n = 5 \dots$
On aura par la première des formules. .

$$a = \frac{\omega}{q^{n-1}} = \frac{243}{3^4} = \frac{243}{81} = 3,$$

c'est-à-dire, que l'on a tiré trois pintes de vin la première fois.

PROBLÈME II. Une personne ayant joué à quitte ou double contre une autre, a perdu dix fois de suite. Elle avoit joué 3^e la première fois ; que perd-elle après la dixième ?

Les données sont..... $a = 3^{\text{e}} \dots$
 $q = 2 \dots n = 10$, & on cherche ω .

H ij

Cette valeur se trouvera par la cinquième formule $\omega = a q^{n-1} = 3.2^9 = 3.512 = 1536^{\text{th}}$.

PROBLÈME III. On suppose que la population d'un pays s'est accrue uniformément tous les ans d'une manière si rapide, que de dix mille ames qu'il y avoit d'abord, il s'en est trouvé 14641 au bout de quatre ans; suivant quelle progression s'est fait cet accroissement ?

$a = 10000 \dots \omega = 14641 \dots n = 5$;
& on demande q . La formule

$q = \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}}$ la donnera. Cette for-

mule devient par les substitutions . . .

$q = \sqrt[4]{\frac{14641}{10000}} = \frac{11}{10}$. L'accrois-

sement annuel a donc été de $\frac{11}{10}$.

PROBLÈME IV. Pour s'être obstiné à plaider, il en a coûté 121000th à un

plaideur forcené. Le premier procès ne lui coûte que 1000^{fr}; mais le dernier lui a coûté 81000^{fr}. On fait d'ailleurs que les frais des autres ont été moyens proportionnels entre ces deux extrêmes: on voudroit savoir combien ce plaideur a perdu de procès.

Soient... $a = 1000^{\text{fr}}$... $w = 81000^{\text{fr}}$... $s = 121000$. On trouvera la valeur demandée de n par la formule.....

$$n = 1 + \frac{L. w - L. a}{L. (s - a) - L. (s - w)}, \text{ qui}$$

$$\text{donne } n = 1 + \frac{L. 81000 - L. 1000}{L. 120000 - L. 40000} =$$

$$1 + \frac{L. \left(\frac{21000}{1000} \right)}{L. \left(\frac{120000}{40000} \right)} = 1 + \frac{L. 81}{L. 3} =$$

$$1 + \frac{4 L. 3}{L. 3} = 1 + 4 = 5.$$

PROBLÈME V. Un dissipateur a mangé tout son bien en cinq mois de tems; chaque mois il quadruploit sa dépense,

H iij

& le premier mois il avoit dépensé cent louis. On demande quel étoit son bien ?

$a = 2400^{\text{tt}} \dots q = 4 \dots n = 5$; ainsi la valeur de s se déduira de la formule $\dots s = a \left(\frac{q^n - 1}{q - 1} \right) = \dots$

$$2400 \left(\frac{4^5 - 1}{3} \right) = \dots$$

$$2400 \left(\frac{1024 - 1}{3} \right) = 2400 \cdot \frac{1023}{3} =$$

$$2400 \cdot 341 = 818400.$$

PROBLÈME VI. Insérer deux termes moyens proportionnels géométriques entre 2 & 128 ?

On connoît ici $\dots a = 2 \dots \omega = 128 \dots n = 4$, il ne s'agit que de trouver q pour avoir le second terme $= aq$, ensuite le troisième terme $= aq^2$. Prenons donc la neuvième formule $\dots$

$$q = \sqrt[n-1]{\frac{\omega}{a}}, \text{ qui devient par les}$$

substitutions... $q = \sqrt[3]{\frac{128}{2}} = \dots$

$\sqrt[3]{64} = 4$. Si $q = 4$, le second terme demandé $= aq = 2 \cdot 4 = 8$; & le troisième demandé $= aq^2 = 2 \cdot 16 = 32$. On a donc $\therefore 2 : 8 : 32 : 128$.

On généralise ce problème en l'énonçant ainsi : *insérer un nombre m de moyens proportionnels géométriques entre deux termes donnés a & ω*? Alors $n = m + 2$, & $n - 1 = m + 1$; & la progression cherchée sera.....

$\therefore a : a \sqrt[{\frac{m+1}{a}}]{\omega} : \&c$. Mais $a \sqrt[{\frac{m+1}{a}}]{\omega} =$

$$\sqrt[{\frac{m+1}{a^{m+1}}}]{\omega} = \sqrt[{\frac{m+1}{a^{m+1}-1}}]{a^{m+1}-1 \omega} =$$

$\sqrt[{\frac{m+1}{a^m \omega}}]{a^m \omega}$. La progression cherchée devient donc :

$$\begin{aligned} & \therefore a : \sqrt[m+1]{a^m \omega} : \sqrt[m+1]{a^{n-1} \omega^2} : \dots : \\ & \sqrt[m+1]{a^{m-2} \omega^3} \dots \omega. \end{aligned}$$

PROBLÈME VII. Entre les termes consécutifs d'une progression géométrique, insérer un nombre p de moyens proportionnels.

Soit représentée par $\therefore a q^0 : a q^1 : a q^2 : a q^3 : a q^4 : \&c.$ la progression dont il s'agit. Par une propriété des progressions géométriques expliquée plus haut, si l'on insère entre les exposans consécutifs des termes de notre progression un nombre p de moyens proportionnels arithmétiques, les termes affectés de ces exposans seront les moyens proportionnels géométriques demandés. Ainsi, pour insérer cinq de ces termes dans la formule, on écrira,

$$\begin{aligned} & \therefore a q^0 : a q^{\frac{1}{6}} : a q^{\frac{2}{6}} : a q^{\frac{3}{6}} : a q^{\frac{4}{6}} : a q^{\frac{5}{6}} : \dots \\ & a q^1 : a q^{1+\frac{1}{6}} \text{ ou } a q^{\frac{7}{6}} : a q^{\frac{8}{6}} : \&c. \end{aligned}$$

PROBLÈME VIII. Trouver le quinzième terme d'une progression géométrique dont le premier terme $a=12$, & l'exposant $q=100$.

$n = 12 \times 100^{14} = \dots\dots\dots$
12000000000000000000000000000000.

L'usage des logarithmes abrège cette solution.

Solutions des problèmes du premier degré.

Solution du problème A. Le nombre des écus est 12.

Solution du problème B. Dans sept ans l'âge du père ne sera que le triple de celui du fil.

Solution du problème C. La personne charitable avoit 24 sous, & elle avoit trouvé onze pauvres.

Solution du problème D. Cet ouvrier gagnoit 6^{te} par semaine.

Solution du problème E. Cet oncle avoit sept neveux & quatre nièces.

Solution du problème F. La formule qui résout les trois cas du problème est

$$x = \frac{cn \mp d}{b + c}, \text{ \& } x \text{ exprime le nom-}$$

bre des coups manqués.

Solution du problème G. Ce joueur avoit 21st avant que de jouer.

Solution du problème H. En commençant, A avoit 26 écus, B en avoit 14, & C en avoit 8.

Solution du problème I. Soit A le courier de Paris, B celui de Fontainebleau, le rapport de leurs vitesses respectives $:: m : n$, la distance de Paris à Fontainebleau $= d$, la distance de Paris au lieu de rencontre sera...

$$x = \frac{m d}{m + n}.$$

Faisant dans cette formule $d = 14$, $m = 3$, $n = 4$, on trouvera $x = 6$ lieues.

Problèmes du second degré à résoudre.

Problème AA. Trouver un nombre tel qu'en le divisant en m parties égales, le produit de toutes ces parties soit égal à celui de $m + 1$ parties égales du mê-

me nombre ; de manière , par exemple , que le produit des deux moitiés de ce nombre soit égal au produit de ses trois tiers ?

Problème BB. Etant donnés le produit p de deux poids , & leur différence d , chercher combien chacun de ces poids-là pèse.

Problème CC. Etant connues la somme de deux nombres & la somme de leurs cubes : trouver ces nombres.

Problème DD. Quel est le nombre dont p fois la puissance m est égale à g fois la puissance $m+2$?

Solutions des problèmes du second degré.

Solution du problème AA. Le nombre demandé est $6\frac{3}{4}$, ou $\frac{27}{4}$. Voici la formule de ces sortes de problèmes , ..

$$x = \frac{(m+1)^{m+1}}{m^m}.$$

Solution du problème BB. La valeur
des

des deux poids est exprimée par la formule.... $\pm \frac{1}{2}d + \sqrt{\frac{4p + d^2}{4}}$...

en prenant + pour le plus grand, & — pour le plus petit.

Solution du problème CC. La somme de ces nombres étant a , & b la somme de leurs cubes ; la formule.....

$$\frac{1}{2}a \pm \sqrt{\frac{4b - a^3}{12a}}$$

exprime la valeur du plus grand avec le signe positif, & celle du plus petit avec le signe négatif.

Solution du problème DD. La formule..... $x = \sqrt{\frac{p}{g}}$ exprime la valeur du nombre cherché.



N. B. Ces Tables, qui complètent le Traité d'Arithmétique, n'ayant pu entrer dans ce Traité qu'elles auroient trop grossi, & exigeant pour plus grande facilité la connoissance des logarithmes, se trouveront ici à la suite de l'Algebre, qui se lie naturellement avec l'Arithmétique.

Los Tables suivantes donnent la connoissance des monnoies qui ont cours, dans les quatre parties du monde; elles présentent à-la-fois les noms des espèces, les lieux où elles ont cours, leur poids, leur titre & leur valeur en argent de France, avec des observations relatives aux articles qui méritent une explication plus étendue. Les poids & les titres rapportés, ont été établis & constatés soit par des essais authentiques, soit par des essais particuliers, faits avec toute la précision dont cet art est susceptible; & leur valeur en argent de France est annoncée sur les prix fixés, moins par leur valeur intrinsèque, que par la volonté des Souverains, ou par l'usage.

C'est d'après l'essai sur la qualité des monnoies étrangères fait par M. Macé de Richebourg, ancien Inspecteur de MM. les Elèves de l'Ecole Royale Mi-

litaire , qu'on rapporte le poids , le titre & la valeur de quelques monnoies étrangères , avec la quantité de grains de fin qu'elles contiennent en matière pure , c'est-à-dire , dégagées de tout alliage.

Enfin la valeur des anciennes monnoies de France annoncée , est celle que l'on donne aux Hôtels des Monnoies , fixée par les Tarifs arrêtés en la Cour des Monnoies.

TABLES de la plupart des Monnoies courantes dans les quatre parties du monde, contenant leurs noms, les lieux où elles ont cours, leurs poids, leur titre & leur valeur, avec des observations reliées, en 1767, par M. Albert de Basinghen, Conseiller-Commissaire en la Cour des Monnoies de Paris.

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.		
		gros. $\frac{1}{2}$	gr	kar.	32.	liv.	sol.	den.
Albertus....	Flandre.....	1	24	21	12	14	11	7
Auguste....	Saxe.....	3	35	21	12	38	6	9
Auguste, 1756, altéré,...	Saxe,.....	1 $\frac{1}{2}$	56	15	8	13	8	8

TABLES DES MONNOIES. 153

Bezant.....	Bizance....	la 3 ^e race des R. F.....	24				
Carolin.....	Francfort...	2	19		16	24	6
Carolin.....	Anspach.....	2	29 $\frac{1}{2}$		6	22	8
Carolin.....	Bade-Dour- lach.....	2 $\frac{1}{2}$	1		8	22	9
Carolin.....	Bavière.....	2 $\frac{1}{2}$	3		14 $\frac{2}{3}$	23	19
Carolin.....	Cologne.....	2 $\frac{1}{2}$			16	23	13
Carolin.....	Fulde.....	2	35 $\frac{1}{2}$		8	23	5
Carolin.....	Hesse.....	2 $\frac{1}{2}$			16	23	13
Carolin.....	Hesse-d'Arm.	2 $\frac{1}{2}$			21	23	17
Carolin.....	Hesse-Cassel.	2 $\frac{1}{2}$	1		16	23	15
Carolin.....	Montfort...	2	33		4	22	15

MONNOIES D'OR.

Noms des Pièces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros.	gr.	kar.	32.	liv.	fol den.
Carolin.....	Palatinat....	2	$1\frac{1}{2}$	18	10	23	13 5
Carolin.....	Wirtemberg.	2	$1\frac{1}{2}$	18	10	23	8 5
Casillan....	Espagne....					10	
Chaïses, 1308.	France.....	1	$1\frac{1}{2}$	24		1	5
Charles.....	Brunswick..	1	$1\frac{1}{2}$	21	24	19	1
Chérif,.....	Egypte.....					6	17 3
Copec.....	Moscovie....			14	18	1	19 8
Cruzade,	Portugal,			21		2	16 10
1734.....				18	28		

Denier d'or de S. Louis à l'Aiguel...	France.....	1	5	24	12	6
Denier d'or aux fleurs-de- lys,						
Roi Jean	France.....	1	30	24	2	2
Double Hen.						
Henri III ...	France.....	1	$\frac{1}{2}$ 29	22	$\frac{3}{4}$ 12	
Doub. Louis,						
1726	France.....	4	18	22	48 av.	1785.
Ducat.....	Wirtemberg.		$\frac{1}{2}$ 29	23	16	17
Ducat.....	Saxe.....		$\frac{1}{2}$ 29	23	16	17
Ducat.....	Mayence....		$\frac{1}{2}$ 28	23	16	13 8

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.		
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	kar.	32.	liv.	fol.	den.
Ducat.....	Hanovre, George II..	$\frac{1}{2}$	27	23	16	10	10	3
Ducat.....	Suède.....	$\frac{1}{2}$	29	23	16	10	17	
Ducat.....	Hollande..	$\frac{1}{2}$	29	23	24	10	19	4
Ducat.....	Danemarck.	$\frac{1}{2}$	29	21	24	10	19	4
Ducat cour..	Danemarck..	$\frac{1}{2}$	16	21		7	15	2
Ducat.....	Hesse-d'Arm.	$\frac{1}{2}$	29	23	8	10	14	8
Ducat.....	Hambourg..	$\frac{1}{2}$	29	3	12	10	15	10
Ducat R....	Bohême....	$\frac{1}{2}$	30	23	24	11	2	8

TABLES DES MONNOIES. 155

Ducat.....	Francfort...	$1\frac{1}{2}$	29	23	20	10	18	2
Ducat.....	Italie.....	$1\frac{1}{2}$	29	23	20	10	18	2
Ducat.....	Hongrie....	$1\frac{1}{2}$	29	23	24	10	19	4
Ducat.....	Prusse.....	$1\frac{1}{2}$	29	23	24	10	19	4
Ducat double	Palatinat...	1	22	23	16	21	15	1
Ducaton.....	Hollande...			23	16	33	13	3
Ecus à la Couronne, 1300 — 1418.	France.....	1	30	24		2		
Fanos.....	Aux Indes..				<i>depuis trois sols jusqu'à six sols.</i>			
Fleurs-de-lys d'or. 1365.	France.....	1		24		1		
Florins.....	Bourgogne..	$1\frac{1}{2}$	13	17	$\frac{1}{2}$	12		

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.	Valeur en ar- gent de France.		
		gros.	$\frac{1}{2}$ gr.		liv.	fol.	den.
Florins.....	Allemagne & Metz.....	$\frac{1}{2}$	13	14	10		
Florins doub.	Hanovre....	1	24	18	16	5	
Florin.....	Hanovre....	$\frac{1}{2}$	28	18	8	2	6
Franc d'or fin 1360.....	France.....	1	1	24	1		
Francs à che- val. 1423.	France.....	$\frac{1}{2}$	21	24	1		
Frédéric....	Berlin.....	1	18	21	19	9	4

	1	$\frac{1}{2}$	18	15	12	13	15	3
Frédér. 1756.	Berlin.....							
Goltshut...	Chine.....							
Guinée de.								
1753 valant								
21 schelins.	Angleterre..	2	13	22		24	18	8
Pièces de 5							$\frac{3272}{177517}$	
guinées....	Angleterre..	10 $\frac{1}{2}$	25	21	30	123	13	7
$\frac{1}{2}$ Guinée...	Angleterre..	1	3	21	24	11	15	6
Henri d'or,								
Henri II....	France.....	$\frac{1}{2}$	32	23	$\frac{1}{4}$	2	10	
Hongre.....	Hongrie.....			23	8	10	10	
Jacobus, de								
Jacques I....	Angleterre..	2	24	22		14	10	

pèse ordinairement trente-deux onces.

en matière pure.

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	kar.	32.	liv. fol. den.
Léopold de 1702, de $36\frac{1}{4}$ au marc	Lorraine....	1 $\frac{1}{2}$	18	21	24	18 à 19 ⁴
Lion d'or... Lys d'or, 1656....	France.....	1	20	24		1 5
Louis d'or de 1726....	France.....	2	$9\frac{1}{5}$	23	$\frac{1}{4}$	7
						24 av. 1785.

Louis d'or de 1785, de 32 au marc...	France.....	2		22		24 dep. 1785.
Louis vieux, antérieurs à 1709.....	France.....	1 $\frac{1}{2}$	18	21	$\frac{2}{32}$ 19	1
Louis de 37 $\frac{1}{2}$ au marc...	France.....	1	$\frac{1}{2}$ 14	22	18	12
Louis au So- leil.....	France.....	2	9	21	24 23	5
Louis de 25 au marc..	France.....	2	$\frac{1}{2}$ 4	22	27	18

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	kar.	32.	liv. fol. den.	
Louis de Noailles....	France.....	3	14	21	24	34	16
Louis ou Pistole....	Palatinat....	1 $\frac{1}{2}$	16	21	28	19	1 6
Louis ou Pistole..	Lunebourg..	1 $\frac{1}{2}$	17	21	20	19	4 1
Mœdadvio.	Portugal....			21	22		
Marabotin..	France.....	1	4	23		11	11

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	kar.	32.	liv.	sol. den.
Nobles à la Rose, 1334.	Angleterre.	2		23			
Nobles-Hen- ri.....	Angleterre..	1	$\frac{1}{2}$	23			
Or.....	Un million d'or, est un million d'écus de 3 ^{tt} .		22		$\frac{1}{2}$		
Or fol.....	Cette expression de compte triple la valeur ordinaire.						
Oubang.....	Japon.....						
Pagodes....	Indes orient.						

vaut environ cent rixdalles d'Hollande.
un peu au-dessous de la $\frac{1}{2}$ pistole d'Esp.

TABLES DES MONNOIES. 163

Pavillon, en	France.....	1	24	24	1	10
1339.....						
Philippus...	Flandres....	voyez Ride.				
Pièces ou						
Lisbonines.	Portugal....	3 $\frac{1}{2}$	18 à 20	22	42	2
Pistole d'or..	Espagne....	1 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	22	19	19 10
Pistole dou-						
ble, au ba-						
lancier, à						
la croix,						
potencé & à						
l'écusson						
simple.....	Espagne....	3	30	21	24 38	12 5

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	kar.	32.	liv.	fol. den.
Pistole cor- nue.....	Espagne....	3	1	21	24	39	14 5
Pistole simple cornue....	Espagne....	$\frac{1}{2}$	21	21	28	9	18 11
Pistole Pistole de Ferdinand &	Espagne....	1	17	21	24	19	12 6
d'Isabelle.	Espagne....	1	21	23	25	22	10 2

TABLES DES MONNOIES. 165

Quart de Piſtole.....	Eſpagne.....	33	21	16	5	10	5
Piſtole.....	Eſpagne.....	19	22		20	3	4
Piſtoles.....	Eſpagne.....	1					
Piſtole d'or..	Savoie.....	2	21	$\frac{1}{4}$	28	5	7
Portugaïſes, en France ſous Louis XIII.....	Portugal.....	9	23	$\frac{3}{4}$			
Quadruple..	Pérou.....	7	21	18	79	2	7
Quinzains d'or en 1719.	France.....		24				15

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	kar.	32.	liv. fol. den.	
Reines d'or, Blanche, mere de S.							
Louis.....	France.....	3	$\frac{1}{2}$	23			
Ride, ou							
Philippus.	Flandres....		$\frac{1}{2}$	13			
Rider.....	Hollande....	2	$\frac{1}{2}$	22		29	4 6
Rose-noble..	Hollande....						
Roupie.....	Mogol, &c..	2	$\frac{1}{4}$	24		38	1 1

Roponi.....	Toscane....	2	$\frac{5}{2}$	16 $\frac{1}{2}$	23	28	33	14	1
Rubie.....	Alger, Con- go & Labes.	v. 35 aspres.							
Ruyder.....	Hollande...	2	$\frac{1}{2}$	5	22		29	4	9
S. Erienne..	Portugal....	1	$\frac{1}{2}$	18	21	28			
S. Thomé...	Portugal....		$\frac{1}{2}$	27	23		10	15	0
Saluts d'or..	France.....	1		1	24		1	5	0
Scharafy....	Egypte.....	vaut l'ancien écu de France.							
Scherefy....	Perse.....	vaut 64 réaux d'Espagne.							
Schéris ou Sultanins..	Au Caire....						5 à 6 th		
Sequin.....	Rome, Flo- rence, &c..				23	14			

MONNOIES D'OR.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr. $\frac{1}{2}$	kar.	32.	liv. fol.	den.
Sequin.....	Gènes.....	$\frac{1}{2}$	29 $\frac{1}{2}$	23	$\frac{7}{8}$	11	4
Sequin.....	Turquie.....	même que le Scherif.					
Séraphin....	Perse.....	même que le Scharafy.					
Souverains..	Pays-Bas....	1	32	22		16	8
Souverains,	Pays - Bas						9
	Autrichiens,						
	1759.....	2 $\frac{1}{2}$	29	22	6	32	18
	1750.....	1	32	21	24	10	1
$\frac{1}{2}$ Souverains.							4

Sultanin

Sultanin....	Au Caire....	même que le Schérif.
Tela.....	Perse.....	vaut le ducat d'or d'Allemagne.
Tonne d'or..	Hollande...	monn. de compte vaut 100000 fl. d'Holl.
Ziam.	Alger.....	vaut cent aspres.

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLO.

Noms des Pièces.	L'endroit où elles ont cours.	Poids.		Tür.		Valeur en ar- gent de France.		
		gros.	gr.	den.	32.	liv.	fol.	den.
Abassy.....	en Perse...	$\frac{1}{2}$	22	8	20		18	4
Abra.....	Pologne & Constantin..	$\frac{1}{2}$	18	6	10		3	6
Abukesh ou Dallars.....	Au Caire...	3 $\frac{1}{2}$	27	8	20	3	4	2
Altrin.....	Moscovie...	monnaie de compte.....					4	8
Areb.....	Amadab....	monnaie de compte vaut 400 lacs.						
Aspres.....	Turquie....	environ 120 pour 3 ^{te} .						
Atche.....	Turquie....	 4						4 $\frac{1}{2}$

			4	6	9	12	
Baat.....	Siam.....						9
Baïoque....	Rome.....						
Barz.....	Allemagne..			vaut 4 cruzers.			3
Batzen.....	Allemagne..						$6\frac{1}{5}$
Bazzo.....	Il. magne..			variable; environ			1
Béistý ou							
Bestý.....	ancien. mon						$5\frac{1}{9}$
Bezorch....	Ormus.....			étain all. yé.			3
Blaffert....	Cologne....						$\frac{1}{2}$
Blamuifer...	Flandres....			ancien. mon.			6
Blanck.....	Hol'ande..			monnoie de compte.....			6
Blancs.....	France....			ancien. mon.			1
Blankil.....	Maroc....						2

K
L

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{4}$	gr.	den.	2.	liv.	sol. den.
Blare.....	Berne.....					2	1
Burbas.....	Alger.....	12 v. 1	à spre			4	9
Caboletto...	Gè'es.....						
Cache.....	Siam, Chine				environ.		
Campner- d'Haller...	Hollande...					2	17
Caragrouch..	Empire.....	à Constantin.				2	18
Carbequi...	Teffès.....	116 aspres.		10	23	2	5
						3	4

Carlin.....	Naple.....	10		7
Caroline....	Suède.....			19 2
Carolus,				
Charles VIII.	France.....		10 18	10
Cash.....	Tonquin...			<i>peu plus de 1</i>
Cavalot de				
Louis XII.	France.....		6	
Cavallo....	Piémont....		1 12	
Cauris ou	Bengale &			
Coris.....	Siam.....	<i>coquilles dont 2400 valent une roupie.</i>		
Caxa.....	Aux Indes..	<i>mélange de cuivre grossier & de plomb.</i>		
Cayas....	Aux Indes..			$\frac{5}{6}$
Chaoury...	Teffès.....			5 6

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Pièces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.			Valeur en ar- gent de France	
		gros, $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv. sol. den.		
Chayé, Scagh ou Chay.....	Perse.....					4 7		
Chéda.....	Aux Indes..							
Chéda octo..							2	$1\frac{1}{2}$
Chéda rond.							7	
Chouffac....	Poilogre....						8	
Cockien....	Japon.....						8	

Commaſe...	Moka.....				3	2
Conpan....	Indes orient.				9	5
Conadez....	Cochin.....					7
Copec ovale.	Mofcovie..	8	10	12		16
Couronne ou						
Crooton..	Angleterre..	7	60	11	5	15
Couronne...	Danemarck.	4	$\frac{1}{2}$ 14	10	3	6
Crazi.....	Toſcane....				4	
Creuzer....	v. <i>Kreutzer</i> .					
Croche.....	Bâle.....					$2\frac{1}{3}$
Crohol.....	Berne.....	<i>monnoie de compte vaut 100 kreutzers.</i>				
Croiſade....	Portugal...	3	59	10	19	2
Croizat.....	Gènes.....	10	4	11	8	3
					9	9

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des E ^{sp} èces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv. fol.	den.
Croon simple	Copenhague.					3	4 $\frac{17}{24}$
Croon double	Copenhague.					6	8 $2\frac{5}{12}$
Croon quadr.	Copenhague.					12	16 4
Croone.....	Berne.....	<i>mon. de com.</i>					
Croutac....	Dantzick...						
Crown.....	Angleterre..	7 $\frac{1}{2}$	35	11		6	3 7
Cruys-Dalder	Konigsberg...			8	25	7	1 10
Cruzade....	Portugal....	3 $\frac{1}{2}$	32	10	19	3	12

TABLES DES MONNOIES. 177

Christine...	Suède.....				14	11
Daller Ger-						
manique..	Allemagne..	7 $\frac{1}{2}$	8	11	5	5
Daller.....	Hollande...	7	6	8	3	2
Daller.....	Bâle, S. Gal.	7 $\frac{1}{2}$	8	10	4	4
Danck.....	Perse.....	$\frac{1}{6}$ de drag.				
Déalder....	Hollande...	7 $\frac{1}{2}$	15	10	3	3
Déalder Ban-						
co.....	Hambourg..				3	11
Déalder cou-						
rant.....	Hambourg..				3	$\frac{1}{2}$
Denier.....		<i>mon. de com.</i>		<i>variable.</i>		
Deni. comm.	Amsterdam..					$2 \frac{1}{21}$

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des. Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den	gr.	liv.	sol. den
Denier de gros....	Anvers....					2	$\frac{1}{21}$
	Amsterdam.					1	$\frac{7}{8}$
	Anvers....					1	$\frac{7}{8}$
	Bâle.....					1	$\frac{7}{8}$
de Denier..	Bergame....						$\frac{4}{7}$
	Florence....						$\frac{5}{6}$
						5	$\frac{1}{18}$
de lui d'or..							
den. courr. }	Genève....						$\frac{1}{2}$
petite mon. }							

TABLES DES MONNOIES. 179^e

Denier com- mun	Livourne				5 $\frac{1}{10}$
Denier d'or					5 $\frac{1}{20}$
Denier lubs banco	Hambourg				2 $\frac{1}{10}$
Deni. sterlin.	Londres			1	9 $\frac{1}{8}$
	Milan				CU $\frac{1}{80}$
	Paris			1	
Denier	Rome			4	
	Valence			3	
	Venise				6 $\frac{1}{1}$ 1 $\frac{1}{2}$
Denier tour- nois	France				

monnaie de compte dont 12 valent 1 sol.

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.	Titre.	Valeur en ar- gent de France.	
				gr. $\frac{1}{2}$	gr. $\frac{1}{4}$ sol. den.
Deni. Paris		monn. de compte d'un quart plus forte.			
Den. sterling	Angleterre, ..	monn. de compte dont 12 valent 1 £ sterl.			
Denier de					
gros.....	Pays-Bas, ...	mon. de compte dont 12 val. 1 £ de gros.			
Derling....	Venise	1 $\frac{1}{2}$ 11 2			15
Dimph.....	Pologne...				15
Dinarbesty..	Perse.....	monn. de compte qui vaut 10 ¢ simples.			
Double.....	Alger.....				12

Doudou.

Doudou.....	Pondichéri & Surate.....				6
Douzain de François I.	France.....				12
Dreyes.....	Saxe.....				12
Dregling....	Holftein....				8
Diye-Gul....	Hollande....	1 onc.	19	10 21	2
Dubbeltie...	Hollande...	<i>vaut 2 stuyers ou sols de Hollande.</i>			
	Hollande...	1 onc. $\frac{1}{2}$	2	11 3	3
	Livourne....	<i>Idem.</i>		<i>Idem.</i>	5 18
	Milan.....				6 3
	Piémont....				6 1
	Venise.....				6 4

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.		
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	sol.	den.
Ducaton, en 1749.....	Pays - Bas Autrichiens .	1 onc. $\frac{1}{2}$	15	10	$\frac{10}{24}$	6	9	8
Ducaton.....	Liège.....	1 onc.	31	11	$1\frac{1}{2}$	6	11	11
Dutte ou Duyte....	Hollande....							3
Dutgen.....	Dannemarck.						5	
Ecu.....	France.....	7 $\frac{1}{2}$	$15\frac{15}{83}$	11		6		
Demi-Ecu..	France.....	3 $\frac{1}{2}$	$25\frac{49}{83}$	11		3		

TABLES DES MONNOIES. 183

Cinquième		I	$\frac{1}{2}$	$3\frac{3}{8}$	II		I	4		
d'Ecu....	France.....									
Dixième		I	$\frac{1}{2}$	$19\frac{41}{8}$	II					
d'Ecu	France.....									
Vingtième		7	$\frac{1}{2}$	$27\frac{63}{8}$	II					
d'Ecu....	Francé.....									
Ecu.....	Hanovre....			25	IO					
Ecu.....	Hambourg..		$\frac{1}{2}$	9	IO					
Ecu.....	Pavière....			25	9.					
Ecu.....	Ratisbonne..			23	9					
Ecu.....	Bareith.....		$\frac{1}{2}$	2	8					
Ecu.....	Anspach....			22	9					
Ecu.....	Suède.....		$\frac{1}{2}$		IO					

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLO.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.		
		gros. 1 onc.	$\frac{1}{2}$ 7	gr. den.	gr. den.	liv.	fol.	den.
Ecu double..	Danemarck			10	9	11	1	8
Ecu à l'Aigle & au Tro- phée.....	Prusse.....	7	$\frac{1}{2}$	21	9	3	13	9
Ecu gros...	Nassau- Weilbourg..	6	$\frac{1}{2}$	18	11	5	12	3
Ecu gros....	Palatinat....	6	$\frac{1}{2}$	20	11	2	16	
Ecu petit...	Bade-Dourl..	3	$\frac{1}{2}$	6	8	1	3	3

Ecu.....	Savoie.....	1 onc. 1	14	10	12	7	3	1
Escalin.....	Hollande.....						7	6
Esterlin.....	Angleterre.....							4
Fanos.....	Aux Indes.....	<i>d'argent vaut un peu moins de.....</i>						
Fardos.....	Pantam.....					3		18
Fartin ou								
Fardin.....	Angleterre.....					environ.....	3	
Fayole.....	Japon.....	<i>monn. de compte environ = à 10 livres.</i>						
Felours.....	Maroc.....							4
Fenin.....	Naumb.....							3
Flett.....	Dannemarck.....					3		
Flett - Marc-								
Danche...	Dannemarck.....						16	

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros, $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv. fol.	den.
Florin de 1602 & 1603	Gènes.....	1	6	11	6	15	
Florin.....	Liège.....	2	27	6	16	1	2 5
$\frac{1}{2}$ Florin....	Mayence....	2	$\frac{1}{2}$	9	1	1	12
$\frac{1}{2}$ Florin....	Bade-Dour- lach.....	1	$\frac{1}{2}$	8	22	1	3 3
Florin.....	Palatinat....	3	25	11	20	2	6
$\frac{1}{2}$ Florin....	Brunswick..	2	1	9	23 $\frac{1}{2}$	1	8 5

TABLES DES MONNOIES. 187

$\frac{1}{2}$ Florin....	Bade-Bade....	1	$\frac{1}{2}$	13	8	20	1	1	8
$\frac{1}{2}$ Florin....	Anspach....	1	$\frac{1}{2}$	9	8	23	1	7	
$\frac{1}{2}$ Florin....	Bareith....	1	$\frac{1}{2}$	9	9		1	8	
$\frac{1}{2}$ Florin....	Cologne....	1	$\frac{1}{2}$	16	8	22	1	1	8
$\frac{1}{2}$ Florin....	Monfort....	1	$\frac{1}{2}$	16	9		1		9
$\frac{1}{2}$ Florin....	Nervied....	1	$\frac{1}{2}$	15	9		1	1	9
Foile.....	Egypte.....								3
Frans.....									
$\frac{1}{2}$ Frans....	France.....	5	$\frac{1}{2}$	12	10		1		
$\frac{1}{4}$ de Franc..									
Francesconi.	Toscane....	7		12	11		5	12	10
Gros... ₂	<i>monnoie de compte variable.</i>								

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLO.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	fol. den.
Gros, pièce de 32 g...	Saxe.....	7	$\frac{1}{2}$ 10	9		4	17 3
Gros, pièce d'un gr...	Dresde.....	$\frac{1}{2}$	5	3	19		3
Gros de 32 gros.....	Dresde.....	7	$\frac{1}{2}$ 11	10	15	5	15 1
Gros de 8 bons gros..	Mekelbourg.	2	12	7	8	1	2 6

TABLES DES MONNOIES. 139

Gros tournois	France.....	I	7 $\frac{26}{28}$	II	I2	I2
de S. Louis.						
Gulden ou						
Goulde....	Allemagne..	<i>variable valent 24ß & 50ß</i>				
Jule	Rome					5
Konningz-						
Daelder	Allemagne..			9	22	5
Konigs - Da-						
ler.....	Allemagne..					8
Karagrach...	Constantino.					3
Kopffluck:..	Allemagne..					3
Kopffluckh..	Pologne.....	I	18	8	21	13
$\frac{1}{2}$ Kospffluck.	Hesse-Darmf.		$\frac{1}{2}$	9	8	15
						7
						II

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLO.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	sol. den.
Kreutzer ou Creutzer....	Allemagne..			5	$\frac{1}{4}$	environ	18
Kreutzer ou pièce de 6 Kreutzers. Pièce de 12 Kreutzers.	Wirtemberg.	$\frac{1}{2}$	17	4	10	4	7
	Bade - Dour- lach.....	$\frac{1}{2}$	33	6	15	9	

Lacre ou Acre, Lack, Leeth ou Lecque..)	Surate.....	monnaie de compte val. 10000 roupies.			
Lewedaal-					
ders.....	Hollande....			2	2
Liard.....	France.....	57 $\frac{3}{5}$			3
Lys ancien..	France.....	2	11	12	1
Livre tour-					
nois.....	France.....	v. plus bas.			1
Livre d'arge.					
de 1719..	France.....		12	1	1
Livre sterlin.	Angleterre..	mon. de com.	au pair avec le marc d 48 l. . .	23	14

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLO.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	fol. den.
Louis d'arg. de 1641 &							
1720.....	France.....	7	8	11		3	
Maravedis... Maille,	Espagne.....					peu plus de 1	
Obole....	France.....	mon. de compte v. 2 pites.					$\frac{1}{2}$
Piafre.....	Espagne....	7	2	10	20	5	8 11 $\frac{8}{10}$

TABLES DES MONNOIES. 193

Piaſtre dite Péruvienne , fabriquée en 1745.....	Eſpagne.....	7			10	20	5	8	8
Piaſtre vieil. $\frac{1}{2}$ Piaſtre forte de 1728..	Mexique.....	7			10	21	5	8	6
Piaſtre vieille dite du Pé- rou.....		3	$\frac{1}{2}$	1	10	22	2	14	10
Piaſtre aux deux globes de 1748...	Pérou.....	7			10	27	$\frac{1}{2}$	5	8
									11
		7		5	10	22	5	9	7

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		grs. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	fol. den.
Piafre dite quarré long.	N. Mexique.	6 $\frac{1}{2}$	30	10	22	5	8
Piafre vieil.	Pérou.....	7	6	10	21	5	9
Picoli.....	Sicile.....	mon. de com.					
Pièces de 1629 & 1630	Piémont....	1	12	3			2
Pièces de 1640 & 1642	Piémont....	1	12	2	6		1 9

Pièces.....	Savoie.....	1	$\frac{1}{2}$	5	2	23	3	3
Pièces.....	Gènes.....	1			5	22	4	4
Pièces.....	Gènes.....	1	$\frac{1}{2}$	5	5	14	6	6
Pièces pré- fence.....	Aix-la-Chap.	1	$\frac{1}{2}$	11	6	23	16	3
Pièces d'un Stuber...	Comté de la Marck....							
Pièces.....	Pologne....		$\frac{1}{2}$	1	2	16	1	11
Pièces d'un Stuber de 1736.....	Bergues & Juliers...			23	4	4	1	10
			$\frac{1}{2}$		2	20	2	

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLO.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.		
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	fol.	den.
Pièces d'un Stuber de 1738.....	Bergues & Juliers...	$\frac{1}{2}$	9	2			1	9
Pièces d'un Stuber....	Cologne....		35	2	16	1	10	
Pièces vieil- les d'un Stu- ber.....	Clèves.....	$\frac{1}{2}$	2	2	4		1	7

TABLES DES MONNOIES. 197

Pièces de 2 Stubers...	Diatorff....	1	$\frac{1}{2}$	33	2	10	6	8
Pièces de 2 Stubers...	Cologne....		$\frac{1}{2}$	21	3	16	4	6
Pièces de 3 Stubers de 1720.....	Cologne....		$\frac{1}{2}$	32	4	20	6	5
Pièces de 3 Stubers de 1750.....	Cologne....		$\frac{1}{2}$	32	4	10	5	11
Pièces de 4 Stubers...	Brandebourg	1		12	5		8	3

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.		
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	fol.	den.
Pièces de Philippe IV.	Espagne....	7	21	10	9	5	8	3
Pièces de Philippe IV en 1630...	Espagne....	1	33	11	2	6	14	1
Pièces de Charles II en 1672...	Espagne....	4	4	11		3	3	10

Pisot.....	Malte.....		3
Pistole.....	France.....	monnoie de compte.....	10
Pite.....	France.....	monn. de compte vaut $\frac{1}{2}$ maille ou obole $\frac{1}{4}$	6
Pitis.....	Ile de Java..	Coxa des Chinois, 200 valent	1
Plapper.....	Bâle.....		1
Poldingue...	Moscovie...	200 Poldingues valent 1 Rouble.	
Polduras ou			
Poltrachs..	Moscovie...	16 2 20	11
Poluske.....	Moscovie...	vaut $\frac{1}{2}$ Copec.	
Pound.....	Angleterre..	Synonyme de pièce & de livre sterling.	
Pouny.....	Mogol.....	mon. de com. dont 38 v. 1 Roup. de Mad.	
Quadrin.....	Rome.....	50 Quadrins valent 1 Jule.	
Quart d'Ecu.	France, 1580	2 $\frac{1}{2}$ 1 11	15

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr. den.	gr.	liv. fol. den.		
Quarto.....	Espagne.....	vaut 4 maravedis.					
Quilo.....	Florence.....						
Ratze.....	Suisse.....						
Réale & Réaux....		monnoie de billon.				2 13	4
Réaux de 8.	Espagne.....						
Réal de Vel- lon.....	Espagne.....	7	32	11	6		
		8 ^e partie de la piastre courante.					
		$\frac{1}{15}$ de piastre de plata ou d'argent.					

Reis.....	Portugal.....		200 reis val.	1
Rixdaler....	Hollande....	7 20	10 8	5 6 5
Rixdaler-cou- ronne....	Dannemarck.	7 6	9 23	4 19 9
Rixdaler....	Lubeck.....	7 10	8 20	4 9 3
Rixmarc....	Dannemarck.		...environ..	15
Rixoorsh....	Dannemarck.			
Rizé.....		monnoie de compte val. 15000 ducats.		
Ronstique...	Stokholm...		...environ...]	4
Rouble.....	Russie.....	le rouble se divise en 100 copecs.		
Roup.....	Pologne.....		10 20	15
Roupie.....	Mogol, &c..	18	11 15½	2 11 env.
Tael.....	Chine.,....	variable.	...environ ..	6 10

MONNOIES D'ARGENT ET DE BILLON.

Noms des Espèces.	Lieux où elles ont cours.	Poids.		Titre.		Valeur en ar- gent de France.	
		gros. $\frac{1}{2}$	gr.	den.	gr.	liv.	fol den.
Tical.....	Siam.....	3	23	10	20	2	10
Timpfen....	Pologne....	1	35	6	4		12 11
Timpfen....	Prusse.....	1 $\frac{1}{2}$		5	20		12 4
Toman.....	Perse.....	monnaie de compte vaut 50 abassès.					

De la livre en particulier.

La *livre tournois* est composée de 20 sols tournois, & chaque sol de 12 deniers aussi tournois.

La *livre paris* est de 20 sols paris, & le sol paris de 12 deniers paris, chaque sol paris valant 15 deniers tournois ; en sorte qu'une livre paris vaut 25 sols tournois.

La *livre de compte numéraire* est composée de 20 sous, & chaque sou de 12 deniers.

La livre de France vaut

A Amsterdam, 9 sols communs & 5 fenins.

Anvers, 9 sols communs & 6 fenins.

Ausbourg, 22 kreutzers & 2 fenins.

Avignon, 1 livre comme en France.

Bâle, 22 kreutzers.

Bergame, 40 sols de change.

Berlin , 6 bons gros.

Breslaw , 22 kreutzers & 6 fenins.

Cadix , 4 réaux de vellon.

Constantinople , 40 aspres.

Cracovie , 22 gros Polonois & 6 fenins.

Copenhague , 15 schellings Danois & 6 fenins.

Dantzick , 22 gros Polonois & 6 fenins.

Dresde , 6 sylvers gros.

Florence , 3 sols & 11 deniers d'or.

Francfort , 22 creutzers & 6 fenins.

Gènes , 24 sols & 8 deniers courans.

Genève , 26 sols $\frac{1}{2}$ petite monnoie.

Hambourg , 9 sols lubs de banque.

Konigsberg , 22 gros Polonois & 6 fenins.

Leipsick , 6 sylvers gros.

Lisbonne , 166 rées & $\frac{2}{3}$.

Livourne , 3 sols & 11 deniers d'or.

Londres ,

- Londres, 11 deniers sterlins.
 Madrid, 4 réaux de vellon.
 Messine, 48 grains.
 Milan, 26 sols 3 deniers courans.
 Naples, 14 grains.
 Nuremberg, 22 creutzers & 2 fenins.
 Palerme, 48 grains.
 Peterbourg, 19 copecs.
 Rome, 19 bayoques & 1 quatrini.
 Stokholm, 24 fluyvers de cuivre.
 Turin, 18 sols & 2 deniers.
 Valence, 5 sols & 8 deniers.
 Varsovie, 11 florins $\frac{1}{2}$.
 Venise, 2 livres.
 Vienne, 22 kreutzers & 2 fenins.

Fin du second Volume.

TABLE.

<i>RÉSOLUTION des équations du premier degré, avec une seule inconnue ,</i>	page 13
<i>Résolution des équations du premier degré, avec plusieurs inconnues ,</i>	33
<i>Elimination des inconnues ,</i>	27
<i>Problèmes du premier degré à résoudre ,</i>	50
<i>Résolution des équations du second degré ,</i>	54
<i>Des Rapports & des Proportions ,</i>	70
<i>Des Proportions & Progressions arithmétiques ,</i>	77
<i>Formules des Progressions arithmétiques ,</i>	90
<i>Applications de ces formules ,</i>	95
<i>Des Proportions & Progressions géométriques ,</i>	102

T A B L E.

207

<i>Propriétés des Progressions géométriques,</i>	114
<i>Problème général pour tous les cas des progressions géométriques,</i>	121
<i>Formules des Progressions géométriques,</i>	130
<i>Applications de ces formules,</i>	135
<i>Solutions des problèmes du premier degré,</i>	142
<i>Problèmes du second degré à résoudre,</i>	143
<i>Solutions des problèmes du second degré,</i>	144
<i>Tables de la plupart des Monnoies courantes dans les quatre parties du monde, contenant leurs noms, les lieux où elles ont cours, leurs poids, leur titre & leur valeur, &c.</i>	150
<i>De la livre en particulier,</i>	305

Fin de la Table.













